

Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA)  
der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin  
Zweigstelle Eberswalde  
Abteilung Taxonomie der Insekten (chem. DEI)

HANNELORE GAEDIKE

## Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes<sup>1</sup> aufbewahrten Typen — V

### HETEROPTERA

#### Pentatomidae

*acutispinus* BREDDIN, 1909 (*Arvelius*)  
(Sitz. ber. Ges. nat. Fr. 1909, 156–158)

Syntypen, Peru, Bolivia.

DEI: ♂ Lectotypus, ♀ Paralectotypus, Peru, hiermit festgelegt.

*addax* BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 13, 132)

♀ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

*alata* BREDDIN, 1904 (*Dalcantha*)  
(Wien, Ent. Ztg. 23, 18)

♂ Holotypus, Tonkin, Than-Moi, VI.—VII., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*andicola* BREDDIN, 1904 (*Sibaria*)  
(Soc. ent. 19, 49–50)

Syntypen, Ecuador, Peru.

DEI: Lectotypus, Napo, Ecuador, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt; 1 Paralectotypus, Coca, Ecuador, leg. HAENSCH; 1 Paralectotypus, Peru, Amazonas; 1 Paralectotypus, Peru, Marcapata.

*andina* BREDDIN, 1904 (*Discocephala*)  
(Soc. ent. 19, 58)

♀ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

*angularis* BREDDIN, 1904 (*Dalcantha*)  
(Wien, Ent. Ztg. 23, 17)

♀ Holotypus, Sumatra, Deli, im DEI.

*annamita* BREDDIN, 1913 (*Eusarcoris*)  
(Arch. Nat.-gesch. 78 A, 100)

♂ Holotypus, Annam, Phuc Son, XI./XII., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*antenna* BREDDIN, 1900 (*Vitellus*)  
(Ent. Nachr. 26, 33–34)

Syntypen, Queensland, N. South Wales, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, N. S. Wales, hiermit festgelegt; 1 Paralectotypus, Queensland.

<sup>1</sup> Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA), der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten (chem. DEI)

**aper** BREDDIN, 1903 (*Catadipson*)  
(Soc. ent. 18, 90–91)

♀ Holotypus, Fernando Po, Sa. Isabel, im DEI.

**aratrix** BREDDIN, 1904 (*Iphiarusa*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 13–14)

♂ Holotypus, Tonkin, Mauson-Gebirge, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI,  
das „♀“ in der Originalbeschreibung ist wahrscheinlich ein Druckfehler.

**arciferum** BREDDIN, 1909 (*Coptosoma*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 255–257)

♀ Holotypus, Nalanda, Ceylon, leg. HORN, im DEI.

**arcuballista** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 123–124)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**argali** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♂♂ Syntypen, S. Paolo

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, S. Paolo, hiermit festgelegt.

**armaticeps** BREDDIN, 1909 (*Dalpada*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 265–266, Fig. 5)

Syntypen, Ceylon, Kanthaley, Nalanda; Süd Ceylon, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ceylon, Kanthaley, leg. HORN, hiermit festgelegt;  
1 Paralectotypus, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

**arrogantula** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 123)

Syntypen, Peru, im DEI.

DEI: Lectotypus, Peru, Amazonas, hiermit festgelegt.

**aspericollis** PUTON, 1886 (*Amaurocoris*)  
(Expl. Scie. Tunisie, 1886, 15)

1 Holotypus, Tozzer (Tozour, Tunesien), leg. MAYET.

DEI: 1 Exemplar, Tougourt (Algerien), von BREDDIN als „Typ PUTON“ ausgezeichnet.

**bergi** BREDDIN, 1908 (*Podisus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 27, 68)

♀ Holotypus, Paraguay, Asuncion, im DEI.

**bergrothi** BREDDIN, 1903 (*Cazira*)  
(Soc. ent. 18, 33)

♀ Holotypus, Tonkin, Mauson-Gebirge, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**bibax** BREDDIN, 1900 (*Biprorulus*)  
(Ent. Nachr. 26, 31–33)

Syntypen, N. South Wales, im DEI.

DEI: Lectotypus, N.S. Wales, hiermit festgelegt; 1 Paralectotypus, N. S. Wales, Richmond.

**bibos** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♀ Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI.

**bicolor** BREDDIN, 1900 (*Saceseurus*)  
(Stett. Ent. Ztg. 61, 321–322)

Holotypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; Paratypen, Borneo, Mons Kina Balu;  
Banguay.

DEI: 3 Paratypen, Borneo, Kina Balu.

**bifrenatus** BREDDIN, 1906 (*Stiretrus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 25, 194–196)

Syntypen, Ecuador, leg. REISS, im Museum Straßburg und im DEI.  
DEI: Lectotypus, Ecuador, leg. REISS, hiermit festgelegt.

**bilunulata** BREDDIN, 1901 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 16, 124)

Syntypen, Bolivien.  
DEI: ♂ Lectotypus, Bolivien, Coroico, hiermit festgelegt; 1 ♀ Paralectotypus, Bolivia.

**bistillatus** BREDDIN, 1909 (*Ochlerus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1909, 618–619, Fig. 5)

Syntypen, 1 ♀ Peru, Marcapata; 1 ♀ Bolivien, im DEI.  
DEI: ♀ Lectotypus, Bolivien, hiermit festgelegt; 1 ♀ Paralectotypus, Peru Amazonas.

**blanditor** BREDDIN, 1904 (*Podisus*)  
(Soc. ent. 19, 49)

♀ Holotypus, Peru, Marcapata, im DEI.

**boernerii** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 141–142)

Syntypen, Peru, Marcapata.  
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Peru, Marcapata, hiermit festgelegt.

**boopis** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 146)

♀ Holotypus, Surinam, leg. STAUDINGER, im DEI.

**brachyacantha** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 140)

Syntypen, ♂ Bolivien, ♀ Peru.  
DEI: ♂ Lectotypus, Bolivien; 1 ♀ Paralectotypus, Peru, Amazonas, hiermit festgelegt.

**brasiliensis** PIRÂN, 1963 (*Stiretrus*)  
(Rev. Invest. Agric. 17, 317–318, Fig. 3)

♂ Holotypus, Brasil, Espiritu Santo, leg. MICHAELIS; 1 ♂ Paratypus, Brasil, Santa Catharina, leg. MICHAELIS, im DEI.

**breddini** MC ATEE & MALLOCH, 1933 (*Galgupha*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 337, Fig. 199)

♂ Holotypus, Rio Grande do Sul, Brazil, im DEI; Paratypen, Rio Grande, I. 1907, leg. OHAUS, im Museum Dresden.  
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**brevirostris** BREDDIN, 1909 (*Scutellera*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 258–259)

Syntypen, Ceylon, Kandy, leg. HORN, im DEI.  
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Ceylon, Kandy, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**brevitylus** BARBER & SAILER, 1953 (*Amaurochrous*)  
(Journ. Wash. Acad. Sci. 43, 160, Fig. 16, 37, 38, 39)

♂ Holotypus, Massachusetts, Waterton, 28. VI. 1920, leg. SPERRY, im U. S. N. M., Typen Nr. 61520; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 ♂ Paratypus, Sand Hills, Neb., Juli; 1 Paratypus, Lake Okoboji, 8. VII. 1916, leg. STONER.

**brunneipennis** BREDDIN, 1903 (*Oncacontias*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 220–221)

Syntypen, Neu Seeland, leg. OVERBECK, im Museum Hamburg.

DEI: Die beiden im DEI vorhandenen Exemplare mit dem Fundort der Beschreibung tragen auf dem Determinationszettel die Bezeichnung *Oncacontias* n. gen. *pseudacanthosoma* n. spec. Eine Art unter diesem Namen wurde von BREDDIN nicht beschrieben, er hat aber als Gattungstypus von *Oncacontias* die Art *brunneipennis* benannt, so daß man *pseudacanthosoma* BREDDIN in litt. als identisch mit *brunneipennis* ansehen muß. Die beiden vorliegenden Exemplare sind somit Syntypen dieser Art.

**burmeisteri** MC ATEE & MALLOCH, 1928 (*Canopus*)  
(Proc. U. S. Nat. Mus. 72, Art. 25, 15)

♀ Holotypus, Tumupasa, Bolivia, XII., leg. LOPEZ, im U. S. N. M.; Paratypen, São Paulo de Olivencia, Brazil, V. 1923, leg. KLAGES, im Carnegie Mus.; Marcapata, Peru; Bolivia, im DEI; Venezuela, im Museum Stettin.

DEI: 3 Paratypen, Marcapata, Peru; 1 Paratypus, Bolivien.

**capito** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 151–152)

♀ Holotypus, Bolivien, Songo, im DEI.

**carbonarius** BREDDIN, 1904 (*Podisus*)  
(Soc. ent. 18, 154)

♀ Holotypus, Costarica, Chiriqui, im DEI.

**carinata** MC ATEE & MALLOCH, 1933 (*Galgupha*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 282–283, Fig. 161)

♂ Holotypus, Louisiana, Sammlung BAKER, im U. S. N. M.; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Texas, Dallas, 16. V. 1907, leg. HOOD; 1 Paratypus, Corpus Chr., 18. III. 1908, leg. JONES & PATT.

**carnifex** BREDDIN, 1904 (*Podisus*)  
(Soc. ent. 18, 154)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, im DEI.

**celebensis** BREDDIN, 1901 (*Pygoplatys*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 62–63)

♀ Holotypus, Celebes, Kalaëna Ebene, leg. SARASIN, im DEI.

**cerastes** BREDDIN, 1905 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 20, 26)

♀ Holotypus, Costarica, Chiriqui, im DEI.

**ceylanica** BREDDIN, 1909 (*Menida*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 280–281, Fig. 19)

Syntypen, Ceylon, Matala; Negombo; Puttalam; leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Ceylon, Puttalam, leg. HORN, hiermit festgelegt; 1 Paralectotypus, Ceylon, Matala, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Negombo, leg. HORN.

**chrysomela** BREDDIN, 1901 (*Oplomus*)  
(Soc. ent. 16, 53)

Syntypen, Ecuador.

DEI: Lectotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**cingulatus** BREDDIN, 1905 (*Chrysocoris*)  
(Soc. ent. 19, 187)

Syntypen, Banguéy Insel.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Banguéy Insel, hiermit festgelegt.

**civitis** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♂ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

**claricolor** BREDDIN, 1907 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 334–335, Fig. 9)

♀ Holotypus, Amazonas, Obidos, leg. ROLLE, im DEI.

**columbiae** HORVÁTH, 1925 (*Loxa*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 22, 315–316, Taf. IV, Fig. 4)

♂ Holotypus, Columbia, Rio Dagua, im DEI.

**comis** BREDDIN, 1903 (*Adoxoplatus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 369)

Syntypen, Peru, Bolivien, im DEI.

DEI: Lectotypus, Peru, Marcapata, hiermit festgelegt.

**compacta** BREDDIN, 1903 (*Philia*)  
(Soc. ent. 18, 57–58)

Syntypen, Neu Süd-Wales, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Neu Süd-Wales, hiermit festgelegt.

**comptum** BREDDIN, 1899 (*Stenozygum*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 161–162, Fig. 3)

♀ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**concava** MC ATEE & MALLOCH, 1928 (*Galgupha*)  
(Ann. Mus. Zool. Polon. 7, 34–35)

♂ Holotypus, Chapada, Brazil, im Carnegie Mus.; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Paraguay, leg. FIEBRIG.

**confusa** BREDDIN, 1902 (*Antestia*)  
(Wien. Ent. Ztg. 21, 94–95)

Syntypen, Insulae Philippinae, Museum Hamburg und im DEI.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Ins. Philippinae, hiermit festgelegt.

In Wien. Ent. Ztg. 23, 10; 1904 wurde der Name *confusa* von BREDDIN in *philippina* umgeändert, da *confusa* nicht verfügbar ist.

**contracta** MC ATEE & MALLOCH, 1933 (*Galgupha*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 218, Fig. 88)

♂ Holotypus, Gefé Lagoas, Minas Geraes, Brazil, 17. XII. 1898, im Museum Stettin; Paratypen, Rio Negro, Parana, Brazil, leg. BEENKE, im Museum Hamburg; São Paulo, im DEI; Antonio da Barra, Brazil, leg. PUJOL, im Museum Paris.

DEI: 1 Paratypus, São Paulo.

**coxalis** BREDDIN, 1904 (*Brachystethus*)  
(Soc. ent. 18, 178)

Syntypen, Peru, Chiriqui.

DEI: 1 Syntypus, Peru Amazonas.

**crassispinus** BREDDIN, 1909 (*Arvelius*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1909, 159–161, Fig. 7, 8)

♀ Holotypus, Vaterland ?, im DEI.

**cyclopelloides** BREDDIN, 1904 (*Miopygium*)  
(Soc. ent. 18, 153)

Syntypen, Rio Grande do Sul.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben, von BARBER, 1933 als „Typus“ ausgezeichnet.

**decora** BREDDIN, 1899 (*Plantia*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 162–164)

Syntypen, Lombok, Sambalun, 4000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER; Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV.–VI. 1896, leg. FRUHSTORFER.

DEI: Lectotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, V.–VI. 1896, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**decoratulus** BREDDIN, 1901 (*Eusarcoris*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 44–45)

♀ Holotypus, S. Celebes, Bonthain, 1882, leg. RIBBE.

**dentiger** BREDDIN, 1904 (*Lincus*)  
(Soc. ent. 18, 154)

♀ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

**deplanata** BREDDIN, 1909 (*Delpada*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 266–268, Fig. 7)

Syntypen, Ceylon, Kanthaley; Nalanda, leg. HORN, im DEI.

DEI: 7 Syntypen, Ceylon, Kanthaley, leg. HORN, von BREDDIN als *depressula* ausgezeichnet.

**difficilis** BREDDIN, 1914 (*Thyreocoris*)  
(Abh. Senckenb. Nat. Ges. 36, 55)

Syntypen, Brasilien, São Paulo; Rio Grande.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Brasilia, São Paulo, hiermit festgelegt; 1 Paralectotypus, Rio Grande do Sul.

**diluticornis** BREDDIN, 1909 (*Arvelius*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1909, 154–155, Fig. 1, 2)

Syntypen, Venezuela, im DEI.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Venezuela, hiermit festgelegt.

**diomedes** BREDDIN, 1904 (*Eusthenes*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 15–16)

♂ Holotypus, Tonkin, Mauson Gebirge, 3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**distanti** BREDDIN, 1900 (*Accarana*)  
(Ent. Nachr. 26, 19–20)

♀ Holotypus, Nova Guinea, Constantine Bay, im DEI.

**dohrni** BREDDIN, 1900 (*Cosmocoris*)  
(Stett. Ent. Ztg. 61, 278–279)

Holotypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; Paratypen, Nias, im DEI, in Sammlung LANGE und im Berliner Museum.

DEI: 1 Paratypus, Nias.

**dolosa** BREDDIN, 1907 (*Edessa*)

(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 336–337, Fig. 10–11)

Syntypen, Ecuador, Balzapamba, Palmas, im DEI.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Ecuador, Balzapamba; 1 Paralectotypus, Ecuador, Palmas, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**dorcax** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)

(Soc. ent. 18, 132)

♀ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

**eburatula** BREDDIN, 1907 (*Edessa*)

(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 333–334, Fig. 8)

♀♀ Syntypen, Surinam; Costarica, Chiriqui.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Costa Rica, Chiriqui, hiermit festgelegt.

**elaphus** BREDDIN, 1905 (*Edessa*)

(Soc. ent. 20, 26)

♀ Holotypus, Peru, Callanga, im DEI.

**ellenriederi** BREDDIN, 1900 (*Antestia*)

(Stett. Ent. Ztg. 61, 322–323)

Holotypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; Paratypen, Java, Mons Gede; Montes Tengger; Borneo, Brunei, Mons Kina Balu.

DEI: 1 Paratypus, Java occident., Mons Gede, 8000 Fuß, VIII. 1892, leg. FRUHSTORFER; 3 Paratypen, Ost-Java, Tengger-Gebirge, leg. FRUHSTORFER.

**ellenriederi** BREDDIN, 1900 (*Neodius*)

(Stett. Ent. Ztg. 61, 292–293)

Holotypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; Paratypen, Java occident., Pengalengan, 4000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, ohne Fundortangaben.

**enac** BREDDIN, 1904 (*Symphylus*)

(Soc. ent. 19, 59)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1900 m, im DEI.

**exsul** HORVÁTH, 1925 (*Loxa*)

(Ann. Mus. Nat. Hung. 22, 314–315, Taf. IV, Fig. 3)

♂ Holotypus, Patria unbekannt, im DEI.

**fallax** BREDDIN, 1913 (*Eusarcoris*)

(Arch. Nat. Gesch. 78 A, Heft 11, 100–101)

♂ Holotypus, Annam, Phuc Son, XI/XII., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**fallax** BREDDIN, 1898 (*Piezosternum*)

(Ent. Nachr. 24, 264–265)

♀ Holotypus, Afrika, Gold-Küste, im DEI.

**fenestra** BREDDIN, 1903 (*Polytes*)

(Soc. ent. 18, 122)

Syntypen, Peru, im DEI.

DEI: Lectotypus, Peru, Marcapata; 1 Paralectotypus, Peru, Amazonas; 2 Paralectotypen, Peru, Huancabamba, 3000 m, leg. ROLLE, hiermit festgelegt.

***fenestrata*** BREDDIN, 1901 (*Phila*)

(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 35–36)

Syntypen, NO Celebes, Toli-Toli, XI.—XII., leg. FRUHSTORFER; Gegend des Posso Sees, leg. SARASIN; Molukken, Sula Mangoli, leg. DOHERTY, im DEI.

DEI: Lectotypus, Sula Mangoli, X.—XI., leg. DOHERTY; 3 Paralectotypen, Nord Celebes, Toli-Toli, XI.—XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

***forticornis*** BREDDIN, 1900 (*Cuspicons*)

(Ent. Nachr. 26, 29–30, Fig. 2, 2a)

Syntypen, N. South Wales, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, N. S. Wales, hiermit festgelegt.

***fortispinus*** BREDDIN, 1904 (*Sabaeus*)

(Wien. Ent. Ztg. 23, 9)

♀ Holotypus, vielleicht Buru ?, im DEI.

***fossata*** MC ATEE & MALLOCH, 1928 (*Galgupha*)

(Ann. Mus. Zool. Polon. 7, 33–34)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Santa Catharina; 1 ♀ Paratypus, Espirito Santo, Brazil, im DEI; Paratypen, Rio Ubasinho, in Sammlung CANDIDO DE ABREU; Salto da Ubà, Rio Ivahy, 31. X. 1922; Salto da Ariranha, Rio Ivahy, 25. XI. 1922; Paranà, Brazil, im Pilish Mus.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Santa Catharina; 1 ♀ Paratypus Espirito Santo.

***fruhstorferi*** BREDDIN, 1901 (*Cazira*)

(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 59–60)

♀ Holotypus, NO Celebes, Toli-Toli, XI.—XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

***fuscopunctata*** BREDDIN, 1901 (*Nezara*)

(Soc. ent. 16, 123–124)

Holotypus, Espirito Santo, Brasilien, leg. MICHAELIS, im DEI.

***gazella*** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)

(Soc. ent. 13, 131)

Holotypus, Ecuador, Napo, leg. HAENSCH, im DEI.

***gentilis*** BREDDIN, 1903 (*Nezara*)

(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 369)

Syntypen, Peru, im DEI.

DEI: Lectotypus, Peru, Marcapata, hiermit festgelegt.

***gibba*** BREDDIN, 1904 (*Antestia*)

(Wien. Ent. Ztg. 23, 10–11)

♀ Holotypus, Holländisch Neu-Guinea, Kapaur, im DEI.

***gillettii mexicana*** MC ATEE & MALLOCH, 1933 (*Allocoris*)

(Ann. Carnegie Mus. 21, 370–371)

♂ Holotypus, Chilpancingo, Guerrero, 4600 Fuß, leg. SMITH, im U. S. N. M.; zahlreiche Paratypen siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Guanaxuoto.

***gnu*** BREDDIN, 1905 (*Edessa*)

(Soc. ent. 20, 27)

♀ Holotypus, Amazonas, Obidos, leg. ROLLE, im DEI.



**graminicolor** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139–140)

♂ Holotypus, Ecuador, Baños, leg. HAENSCH, im DEI.

**griseolus** BREDDIN, 1904 (*Oncinoproctus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 5–6)

♂ Holotypus, Sikkim, III.–IV., im DEI.

**griseescens** BREDDIN, 1904 (*Polytes*)  
(Soc. ent. 19, 49)

Holotypus, Peru, Amazonas, im DEI.

**guttamellis** BREDDIN, 1903 (*Sastragala*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 203–204, Fig. 8)

♂ Holotypus, Ost-Java, Tengger-Gebirge, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**guttasanguinis** BREDDIN, 1902 (*Sastragala*)  
(Wien. Ent. Ztg. 21, 98–99)

Syntypen, Java occid., Mons Gede, Pengalengan, leg. FRUHSTORFER, im Museum Hamburg und im DEI.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Java, Mons Gede, 8000 Fuß, VIII. 1892, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**haedulus** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 178)

♀ Holotypus, Ecuador, Baños, leg. HAENSCH, im DEI.

**handlirschi** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 142–143)

♀ Holotypus, Peru, Marcapata, im DEI.

**helicoceras** BREDDIN, 1905 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 20, 26)

Syntypen, Venezuela.

DEI: Lectotypus, Venezuela, Esmeralda, leg. SCHIRMER, hiermit festgelegt.

**heros** BREDDIN, 1904 (*Eurostus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 16–17)

♀ Holotypus, Tonkin, Mauson-Gebirge, IV–V., 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**heymonsi** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 147–149)

Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Peru, Marcapata, hiermit festgelegt.

**hirculus** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 178)

♂ Holotypus, Bolivia, im DEI.

**horni** BREDDIN, 1909 (*Catacanthus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 276–277, Fig. 16)

Syntypen, Ceylon, Puttalam; Negombo; leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, Ceylon, Negombo, leg. HORN; 2 Paralectotypen, Ceylon, Puttalam, leg. HORN, hiermit festgelegt.

*horni* BREDDIN, 1909 (*Hemolauis*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 271–272)

♀♀ Syntypen, Ceylon, Nelanda, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Ceylon, Nelanda, leg. HORN, hiermit festgelegt.

*horni* BREDDIN, 1909 (*Tolumnia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 269)

♂ Holotypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI.

*horni* SCHOUTEDEN, 1908 (*Ceratocoris*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 52, 369)

Syntypen, Uganda.

DEI: 3 Syntypen, Brit. Uganda, leg. GRAUER.

*horvathi* BREDDIN, 1903 (*Cazira*)  
(Soc. ent. 18, 34–35)

♂ Holotypus, Tonkin, Mauson Gebirge, IV.–V., 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*ibex* BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 131–132)

♂ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

*imbecilla* BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 123)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

*improvisus* BREDDIN, 1905 (*Brachystethus*)  
(Soc. ent. 20, 26)

♀ Holotypus, Venezuela.

DEI: Holotypus, Venezuela, Esmeralda?

*incisulus* BREDDIN, 1909 (*Ochlerus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1909, 628–629, Fig. 17–18)

Syntypen: Venezuela, Merida; 1 ♂ im DEI, 1 ♀ im Museum Wien.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Venezuela, Merida, hiermit festgelegt.

*incognita* MC ATEE & MALLOCH, 1933 (*Allocoris*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 386–387, Fig. 229)

♂ Holotypus, Fort Yuma, Arizona, 20. II. leg. HUBBARD, im U. S. N. M.; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 4 Paratypen, Boulder Colorado, 21. VII. 1903, leg. VAN DUZEE.

*incomis* BREDDIN, 1907 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 343–344)

♂ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, im DEI.

*indica* BREDDIN, 1912 (*Tessaratomya*)  
(Arch. Nat. gesch. 73 A, Heft 6, 80–81)

♂♀ Syntypen, Ceylon, V. 1889, leg. FRUHSTORFER; Madras, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Madras, hiermit festgelegt.

*inermiceps* BREDDIN, 1900 (*Podops*)  
(Stett. Ent. Ztg. 61, 284–285)

Syntypen, Soekaranda, leg. DOHRN; Java occident., Pengalengan, 4000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: Lectotypus, Java occident., Pengalengan, 4000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*infulata* BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 19, 50)

♀♀ Syntypen, Peru. In der ausführlichen Beschreibung (Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 143–144) wurde von BREDDIN nur Bolivia, Songo erwähnt.

DEI: 1 Syntypus, Bolivia, „n. sp.“ von BREDDIN ausgezeichnet.

*javana* BREDDIN, 1909 (*Menida*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 280, Fig. 21)

Ohne Fundortangabe.

DEI: 2 Syntypen, Ost Java, Tengger-Gebirge, leg. FRUHSTORFER.

*javanus* BREDDIN, 1903 (*Microdeuterus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 218–219)

♂ Holotypus, West-Java, Sukabumi, 2000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*jucunda* BREDDIN, 1904 (*Euaenaria*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 2–3)

♂ Holotypus, Tonkin, Mauson-Gebirge, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*jugatis* BREDDIN, 1907 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 329–330, Fig. 2, 3)

Syntypen, Surinam, im DEI und Museum Straßburg; Brasilien, im Museum Straßburg.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Surinam, hiermit festgelegt.

*kirkaldyi* BREDDIN, 1903 (*Cazira*)  
(Soc. ent. 18, 34)

♀ Holotypus, Sumatra, im DEI.

*laeta* BREDDIN, 1900 (*Eurinome*)  
(Abh. Senckenbg. Nat. Ges. 25, 142–143)

♂ Holotypus, Ternate (44).

DEI: 1 Exemplar, Neu Guinea, nachträglich als Paratypus ausgezeichnet.

*laevigata* BREDDIN, 1901 (*Antestia*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 54–55)

Syntypen, NO Celebes, Toli-Toli, XI.–XII. 1895, leg. FRUHSTORFER.

DEI: Lectotypus, Celebes, Toli-Toli, XI.–XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*langei* BREDDIN, 1899 (*Neodius*)  
(Rev. d'Ent. Caen 18, 80–81)

Holotypus, Syrien, Hierosolyma, leg. LANGE, im DEI.

*lata* BREDDIN, 1899 (*Halyomorpha*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 160–161)

Syntypen, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV.–VI. 1896, leg. FRUHSTORFER; Lombok Pringabaja, VI.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV.–VI. 1896, leg. FRUHSTORFER; 1 Paralectotypus, Lombok, Pringabaja, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*latiusculus* BREDDIN, 1909 (*Hermolaus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 272–273)

♀ Holotypus, Paradna, Ceylon, leg. HORN, im DEI.

**lativittatus** BREDDIN, 1903 (*Symphylus*)  
(Soc. ent. 18, 57)

♂ Holotypus, Archidona, Ecuador, leg. HAENSCH, im DEI.

**latus** BREDDIN, 1909 (*Arvelius*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1909, 155–156, Fig. 3)

♂ Holotypus, Amazonas, Manaos, im DEI.

**latus** BREDDIN, 1904 (*Parochlerus*)  
(Soc. ent. 18, 153)

♀ Holotypus, Peru, Amazonas, im DEI.

**lauta** BREDDIN, 1912 (*Tessarotoma*)  
(Arch. Nat. gesch. 78 A, Heft 6, 81)

Syntypen, Borneo, Tandjong, leg. SÜCK; Kina Balu; im Museum Hamburg und im DEI.  
DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Borneo; 1 Paralectotypus, Kina Balu, hiermit festgelegt.

**lavata** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 123)

♂ Holotypus, Bolivia, im DEI.

**legionarius** BREDDIN, 1914 (*Euschistus*)  
(Abh. Senckenb. Nat. Ges. 36, 56)

Syntypen, Brasilien, leg. FREIREISS, im Museum Frankfurt.  
DEI: 2 Paratypen, Brasilia, leg. FREIREISS.

**leprosula** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 144–145)

♀ Holotypus, Rio Grande do Sul, im DEI.

**leptacantha** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 139–140)

Syntypen, Peru.  
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Peru, Amazonas, hiermit festgelegt.

**leucochalcea** BREDDIN, 1903 (*Philia*)  
(Soc. ent. 18, 58)

♀ Holotypus, Queensland, im DEI.

**leucoryx** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 132)

♀ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

**loboprostethia** SAILER, 1940 (*Galgupha*)  
(Journ. Kansas Ent. Soc. 13, 62–63)

♂ Holotypus, Douglas Co., Kans., in der Sammlung der University of Kansas; 63 Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Scott Co., Mo. 9. XI. 1937, leg. TURNER; 1 Paratypus, Garnett Kan, 1. VII. 1936, leg. OMAN.

**lobuliger** BREDDIN, 1908 (*Lincus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1908, 27–29, Fig. 5–8)

Syntypen: Brasilien, Espirito Santo; 1 ♂, 1 ♀, im Wiener Museum, 1 ♀ im DEI.  
DEI: Lectotypus, Brasilien, Espirito Santo, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**longicorialis** BREDDIN, 1901 (*Nezara*)  
(Soc. ent. 16, 123)

Syntypen, Montevideo.

DEI: Lectotypus, Montevideo ?, hiermit festgelegt.

**lucretia** MC ATEE & MALLOCH, 1933 (*Galgupha*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 225–226)

♂ Holotypus, Sta. Lucretia, Sta. Cruz, Mexico, 22. VI. 1905, leg. KNAB, im U. S. N. M.; Paratypen, 1 ♀ Guatemala, im DEI; 3 ♀♀, Teapa, Tabasco, Mexico, leg. SMITH, im British Museum.

DEI: 1 ♀ Paratypus, Guatemala.

**lunifera** BREDDIN, 1902 (*Sastragala*)  
(Wien. Ent. Ztg. 21, 97–98)

Syntypen, Java, Tengger Montes; Sukabumi, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: Lectotypus, Java, Tengger-Gebirge, leg. FRUHSTORFER; 1 Paralectotypus, Java, Sukabumi, 2000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**magnus** BARBER & SAILER, 1953 (*Amaurochrous*)  
(Journ. Wash. Acad. Sci. 43, 162, Fig. 17, 52, 53, 54)

♂ Holotypus, Edgewater, Florida, 28. II. 1939, leg. FROST, im U. S. N. M., Typen Nr. 61522; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Haulover March, Florida, leg. HUBBARD & SCHWARZ; 1 ♀ Paratypus, Paradise Key, Florida, 23. II. 1919, leg. BARBER.

**major** BREDDIN, 1904 (*Corimelaena*)  
(Soc. ent. 19, 49)

Syntypen, Brasilia.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Espirito Santo.

**major** SAILER, 1952 (*Mecidea*)  
(Proc. U. S. nat. Mus. 102, 486–490, Fig. 89, Taf. 47 Fig. 10–12, Taf. 48 Fig. 33, 34, 52, 59)

♂ Holotypus, Bexar County, Tex., 8. X. 1937, leg. TURNER, im U. S. N. M., Typen Nr. 58421; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Esprza Reh., Brownsville, Texas, VIII.–IX.; 1 Paratypus, Atascosa Mt., 2. II. 1935, leg. BALL.

**malayus** BREDDIN, 1913 (*Eusarcoris*)  
(Arch. Nat. gesch. 78 A, Heft 11, 99–100)

♂♀ Syntypen, Malakka, Kelantan, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Malakka, Kelantan, hiermit festgelegt.

**mausonicus** BREDDIN, 1904 (*Exithemus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 6–7)

♂ Holotypus, Tonkin, Mauson-Gebirge, 2–3000 Fuß, IV–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**mediator** BREDDIN, 1909 (*Lactistes*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 260–261, Fig. 1, 2)

Syntypen, Bandarawella, Ceylon, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Bandarawella, Ceylon, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**mendax** BREDDIN, 1908 (*Nezara*)  
(Soc. ent. 23, 68)

Syntypen, Eritrea.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Asmara, Eritrea, hiermit festgelegt.

**metallicus** BREDDIN, 1904 (*Aspideurus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 10)

♀ Holotypus, Ost-Java, Tengger-Gebirge, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**mexicana** SAILER, 1944 (*Solubea*)  
(Proc. ent. Soc. Wash. 46, 114–116, Taf. 10 Fig. 9)

♂ Holotypus, Vulcano, Colima, Mexico, leg. CONRAD, im U. S. N. M., Typen Nr. 56807;  
zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 2 Paratypen, St. Xavier Msn. Tucson, Arizonas, 12. VIII. 1924, leg. VAN DUZEE.

**minax** BREDDIN, 1903 (*Adoxoplatus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 368)

Syntypen, Bolivien, Peru, im DEI.

DEI: Lectotypus, Bolivia, Yungas de la Paz; 1 Paralectotypus, Peru, Marcapata, hiermit festgelegt.

**minor** BREDDIN, 1903 (*Plautia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 277–278, Fig. 17)

Syntypen, S. Ceylon; Kekirawa, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, Ceylon, Kekirawa, leg. HORN; 2 Paralectotypen, Süd Ceylon, V. 1899,  
leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**moneta** BREDDIN, 1903 (*Chrysodarecus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 367–368)

Syntypen, Peru, im DEI.

DEI: Lectotypus, Peru, Marcapata, hiermit festgelegt.

**montandoni** BREDDIN, 1903 (*Cazira*)  
(Soc. ent. 18, 34)

♀ Holotypus, Tonkin, Chiem Hoa, VIII.—IX., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**montandoni** BREDDIN, 1898 (*Severiniella*)  
(Ent. Nachr. 24, 262–264)

♂ Holotypus, Benguela, im DEI.

**morbosa** BREDDIN, 1907 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 342–343, Fig. 20)

♀ Holotypus, Mexico, Guadalajara, im DEI.

**munda** BREDDIN, 1901 (*Carbula*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 45–46)

Syntypen, S. Celebes, Loka und Umgebung, 1000–1300 m, X. 1895, leg. SARASIN; Wawo-  
karaeng (Schreibweise?), 5000 Fuß, II. 1896, leg. FRUHSTORFER.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, S. Celebes, Bua Kraeng (Schreibweise?); 2 Paralecto-  
typen, Loka und Umgebung, hiermit festgelegt.

**musimon** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♀ Holotypus, Peru, Vilconota, im DEI.

**necopinata** BREDDIN, 1907 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 337–338, Fig. 12)

♂♂ Syntypen, Ecuador, Napo; Coca; im DEI.

DEI: Lectotypus, Napo, Ecuador, leg. HAENSCH; 1 Paralectotypus, Ecuador, Coca, leg.  
HAENSCH, hiermit festgelegt.

**neniator** BREDDIN, 1904 (*Podisus*)  
(Soc. ent. 18, 154)

♀ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

**neobisignata** MC ATEE & MALLOCH, 1928 (*Galgyptha*)  
(Ann. Mus. Zool. Polon. 7, 42)

♂ Holotypus, Chaco de Santiago del Estero, bords' du Rio Salado, environs d'Icano, 1904, leg. WAGNER; zahlreiche Paratypen siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Rio Grande do Sul; 1 Paratypus, Montevideo.

**nigra** BREDDIN, 1901 (*Cuspicona*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 56–57)

♀ Holotypus, S. Celebes, Putunuang, I. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**nigradorsata** BREDDIN, 1901 (*Nezara*)  
(Soc. ent. 16, 123)

Syntypen, Parana.

DEI: Lectotypus, Curitiba, Parana, Süd Brasilien, 15. VI. 1887, leg. DÖRING-WANDSBECK, hiermit festgelegt.

**nigriventris** BREDDIN, 1901 (*Prionocompastes*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 57–59)

Syntypen, S. Celebes, Wawokaraeng (Schreibweise ?), II. 1896, leg. FRUHSTORFER; Loka und Umgebung, 1000–1300 m, X. 1895, leg. SARASIN.

DEI: Lectotypus, Bua-Kraeng (Schreibweise ?), 5000 Fuß, II. 1896, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**nigropicta** BREDDIN, 1906 (*Nezara*)  
(Wien. Ent. Ztg. 25, 193–194)

Syntypen, Amazonas, Manaus, im Museum Straßburg und im DEI.

DEI: Lectotypus, Amazonas, Manaus, hiermit festgelegt.

**nitens** BREDDIN, 1914 (*Thyreocoris*)  
(Abh. Senckenb. Nat. Ges. 36, 55)

Syntypen, Peru, Cumbase, Amazonas.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Peru, Amazonas.

**nitida** BREDDIN, 1901 (*Zangiola*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 52–53)

♂ Holotypus, S. Celebes, Wawokaraeng (Schreibweise ? Bua Kraeng ?), leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**nitidiventris** BREDDIN, 1906 (*Pachycoris*)  
(Wien. Ent. Ztg. 25, 190)

Syntypen, Costa Rica, Chiriqui; San José; M.-Amerika, im DEI und Museum Straßburg.  
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Costa Rica, Chiriqui; 1 Paralectotypus, Costa Rica, San José, hiermit festgelegt.

**nodamentosa** BREDDIN, 1905 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 20, 26–27)

♀ Holotypus, Surinam, ex. coll. FRUHSTORFER, im DEI.

**nodiventris** BREDDIN, 1900 (*Aeschrocoris*)  
(Stett. Ent. Ztg. 61, 299–300)

Holotypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN, im Museum Stettin; Paratypen, Java, Tengger Montes, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Ost Java, Tengger Gebirge, leg. FRUHSTORFER.

*oculata* BREDDIN, 1914 (*Tibialis*)  
(Abh. Senckenb. Nat. Ges. 36, 58–59)

♀ Holotypus, Peru, Marcapata, im DEI.

*oculatorum* BREDDIN, 1905 (*Calliphara*)  
(Soc. ent. 19, 186)

Syntypen, Salomons Inseln.

DEI: 2 Syntypen, Salomons Inseln, 1890, leg. LUCAS.

*offuscata* BREDDIN, 1907 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 332–333, Fig. 6, 7)

Syntypen, Inneres Brasilien, Pebas, im DEI.

DEI: Lectotypus, Pebas, III, hiermit festgelegt.

*onça* BREDDIN, 1904 (*Polytes*)  
(Soc. ent. 19, 49)

Holotypus, Peru, Charchamayo, im DEI.

*ornatula* BREDDIN, 1898 (*Noualhieridia*)  
(Ent. Nachr. 24, 267–268)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Madagascar, im DEI.

*ornatus* BREDDIN, 1900 (*Aspideurus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 161–163)

♀ Holotypus, Java, Pengalengan, 4000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*ornatus* SAILER, 1944 (*Solubea*)  
(Proc. ent. Soc. Wash. 46, 124–126, Taf. 10 Fig. 6, 14)

♂ Holotypus, Hormigueros, Puerto Rico, 11. X. 1943, leg. BRUNET, im U. S. N. M., Typen Nr. 56809; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, San Domingo, leg. STANTON.

*oryx* BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 131)

Holotypus, Peru, Callanga, im DEI.

*oxyacantha* BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 19, 50)

♂♂ Syntypen, Bolivien. Der Fundort wurde von BREDDIN in den Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 138, in Peru, Vilcanota berichtet.

DEI: ♂ Lectotypus, Peru, Amazonas, von SAILER & LUTZ untersucht und ausgezeichnet, hiermit festgelegt. 1 ♂ Paralectotypus, Peru, Amazonas, wurde von SAILER & LUTZ als *leptacantha* BREDDIN determiniert.

*pachyacantha* BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 136–138)

Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Peru, Marcapata, hiermit festgelegt.

*pacifica* BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♀ Holotypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH, im DEI.



**pallidus** PUTON, 1887 (*Cydnus*)  
(Rev. d'Ent. Caen 6, 298—299)

Typen, Biskra, Algerien.

DEI: 2 Exemplare, Tougourt (ca. 200 km südlich Biskra), von BREDDIN als „Typ PUTON“ ausgezeichnet.

**paradisiaca** BREDDIN, 1905 (*Calliphara*)  
(Soc. ent. 19, 186)

♀ Holotypus, Sumba Insel, im DEI.

**parens** BREDDIN, 1900 (*Ityramorpha*)  
(Ent. Nachr. 26, 37—38, Fig. 8)

Holotypus, Queensland, im DEI.

**paris** BREDDIN, 1899 (*Eusthenes*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 165—166, Fig. 4)

2 ♂♂ Syntypen, Lombok, Sambalun, 4000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**patulus** BREDDIN, 1904 (*Rhynchacoris*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 11—12)

♀ Holotypus, Süd-Java, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**pauper** BREDDIN, 1898 (*Pygomenida*)  
(Ent. Nachr. 24, 117—118)

1 Syntypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER; 5 Syntypen, Java, im Museum Dresden.

DEI: Lectotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**pauperata** BREDDIN, 1901 (*Antestia*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 55—56)

Syntypen, S. Celebes, Makassar, leg. SARASIN.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, S. Celebes, Makassar, leg. SARASIN, hiermit festgelegt.

**pedestris** BREDDIN, 1902 (*Mesolea*)  
(Wien. Ent. Ztg. 21, 100—101)

Syntypen, India borealis, Sikkim, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Sikkim, hiermit festgelegt.

**perscita** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 149—151)

Syntypen: ♀ Bolivien, Yungas de la Paz; ♂ Peru, Amazonas.

DEI: ♂ Lectotypus, Peru, Amazonas; 1 ♀ Paralectotypus, Bolivien, Yungas de la Paz, hiermit festgelegt.

**philippina** BREDDIN siehe *confusa* BREDDIN

**picticornis** HORVÁTH, 1925 (*Loxa*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 22, 312—313, Taf. IV Fig. 2, Taf. V Fig. 2)

Syntypen, Brasilia, Espirito Santo, im Museum Budapest und im DEI; Rio Grande do Sul, Alagoinhas; Ecuador, Playas; Galapagos; Panama, im Museum Wien.

DEI: 5 Syntypen, Brasilien, Ponta da Cadi, Espirito Santo, III. 1921, leg. HOFFMANN.

**picturata** BREDDIN, 1904 (*Rumibia*)  
(Soc. ent. 18, 177—178)

Syntypen, Peru.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Peru, hiermit festgelegt.

**placida** BREDDIN, 1905 (*Calliphara*)  
(Soc. ent. 19, 186)

Syntypen, Neu Guinea.  
DEI: 2 Syntypen, Arfak, Neu Guinea.

**planicarinata** BREDDIN, 1912 (*Tessarotoma*)  
(Arch. Nat. gesch. 78 A, Heft 6, 79–80)

2 ♀♀ Syntypen, Insel Flores, im DEI.  
DEI: Lectotypus, Flores, hiermit festgelegt.

**plautioides** BREDDIN, 1909 (*Antestia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 278–279, Fig. 18)

♀ Holotypus, Ceylon, Putalan, leg. HORN, im DEI.

**pontificalis** BREDDIN, 1905 (*Chrysocoris*)  
(Soc. ent. 19, 187)

♀ Holotypus, Süd Celebes, Bua-Kraeng, 5000 Fuß, II. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**porrectispinus** BREDDIN, 1909 (*Arvelius*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1909, 158–159, Fig. 6)

♂ Holotypus, Britisch Guiana, Mallali; 1 ♀ Paratypus, Colombia, Esmeralda, im DEI.

**porrectus** BREDDIN, 1907 (*Eusarcoris*)  
(Wien. Ent. Ztg. 26, 93)

♂ Holotypus, Indisches Festland, Punjab, Rawalpindi, leg. RAST, im DEI.

**praecursor** BREDDIN, 1901 (*Niphe*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 42)

Syntypen, S. Celebes, Makassar, leg. PLATEN.  
DEI: Lectotypus, Celebes, Makassar, leg. PLATEN, hiermit festgelegt.

**prasina** HORVÁTH, 1925 (*Loxa*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 22, 322, Taf. V Fig. 8)

♀ Holotypus, Venezuela, Merida, im DEI.

**profana** BREDDIN, 1912 (*Mormidea*)  
(Ent. Mitt. 1, 352–353)

Syntypen, Brasilia, Curitiba, Parana, im Museum Hamburg; Rio Grande do Sul, im DEI.  
DEI: Lectotypus, Rio Grande do Sul, hiermit festgelegt.

**profanus** BREDDIN, 1909 (*Ochlerus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1909, 619–620, Fig. 6)

♀♀ Syntypen, Peru, Marcapata, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Peru, Amazonas.

**proletaria** BREDDIN, 1899 (*Auletrissa*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 159–160, Fig. 1)

♀ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.  
DEI: Holotypus, ohne Fundortangabe.

**pugil** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♀♀ Syntypen, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI.  
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**pulchricornis** BREDDIN, 1903 (*Nezara*)  
(Soc. ent. 18, 115)

♂ Holotypus, Fernando Po, im DEI.

**punctatissimum** BREDDIN, 1909 (*Coptosoma*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 251–252)

♀ Holotypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI.

**punctatissimus** BREDDIN, 1900 (*Paranotius*)  
(Ent. Nachr. 26, 18–19)

Zahlreiche Syntypen, Australia, Richmond, New South Wales.  
DEI: Lectotypus, N. S. Wales, hiermit festgelegt.

**punctifer** MC ATEE & MALLOCH, 1933 (*Galgupha*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 264–265)

♂ Holotypus, Cacao Trece Aguas, Guatemala, 12. IV., leg. SCHWARZ, im U. S. N. M.; zahlreiche Paratypen, alle Mittelamerika, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Costa Rica; 1 Paratypus, Am. bor.

**punctiventris** BREDDIN, 1904 (*Anaca*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 10)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**rastratum flexum** MC ATEE & MALLOCH, 1933 (*Amyssonotum*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 351, Fig. 211)

Holotypus und Paratypen, Volcan de Chiriqui, Panama, leg. CHAMPION, im U. S. N. M.; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Surrubres, Costa Rica, 300 Fuß, leg. HEYNE.

**rectangulatum** BREDDIN, 1901 (*Megymenum*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 63–64)

Syntypen, S. Celebes, Gegend von Enrekang und Sosso (Duri), VIII. 1895, leg. SARASIN; Poloppo, I. 1895, leg. SARASIN.  
DEI: Lectotypus, Poloppo, I. 1895, leg. SARASIN; 1 Paralectotypus, S. Celebes, hiermit festgelegt.

**rectispinus** BREDDIN, 1904 (*Sabaeus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 8)

♀ Holotypus, Java, Malang, im DEI.

**recurvicornis** BREDDIN, 1900 (*Cuspicona*)  
(Ent. Nachr. 26, 28–29, Fig. 1, 1a)

Syntypen, N. South Wales, im DEI.  
DEI: Lectotypus, N. S. Wales, hiermit festgelegt.

**regularis** MCATEE & MALLOCH, 1933 (*Galgupha*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 231)

♂ Holotypus, La Plata, im DEI.

**reuteri** BREDDIN, 1903 (*Cazira*)  
(Soc. ent. 18, 33–34)

♂ Holotypus, Tonkin, Than-Moi, VI.–VII., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**rimata** BREDDIN, 1907 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 338–339, Fig. 15)

♀ Holotypus, Peru, Iguapo, im DEI.

**rubida** BREDDIN, 1901 (*Tessarotoma*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 61–62)

Syntypen, Nord Celebes, Toli-Toli, XI. – XII. 1895, leg. FRUHSTORFER; Posso See und Umgebung, II. 1895, leg. SARASIN.

DEI: Lectotypus, Celebes, Toli-Toli, XI. – XII. 1895, leg. FRUHSTORFER; 1 Paralectotypus, Posso-See und Umgebung, II. 1895, leg. SARASIN, hiermit festgelegt.

**rufescens** BREDDIN, 1900 (*Cresphontes*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 163–165)

♂ Holotypus, Java, Sukabumi, 2000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**rupicapra** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♀ Holotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, im DEI.

**ruth** BREDDIN, 1903 (*Pachycoris*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 366)

Syntypen, Bolivien, Yungas de La Paz, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Bolivien, Yungas de La Paz, 1000 m, hiermit festgelegt.

**sabulicolor** BREDDIN, 1909 (*Coptosoma*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 250–251)

♂ Holotypus, Ceylon, Negombo, leg. HORN, im DEI.

**sagax** BREDDIN, 1904 (*Oplomus*)  
(Soc. ent. 19, 49)

♀ Holotypus, Bolivien, im DEI.

**saiga** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 132)

♀ Holotypus, Peru, Marcapata, im DEI.

**salebrosus** BREDDIN, 1900 (*Prionocompastes*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 166–167)

♀ Holotypus, Java occidentalis, Pengalengan, 4000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**sarasinorum** BREDDIN, 1901 (*Sabacus*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 49–51)

♀ Holotypus, NO Celebes, Gegend zwischen Tomohan und Rurukan, 1894, leg. SARASIN, im DEI.

**sastragaloides** BREDDIN, 1903 (*Dichobothrium*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 208–209)

Syntypen, West Java, Gede Gebirge, 8000 Fuß, VIII. 1892, leg. FRUHSTORFER, im DEI und Museum Berlin.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**satrapa** BREDDIN, 1901 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 16, 124)

♀ Holotypus, Bolivien, im DEI.

**scabriuscula** BREDDIN, 1903 (*Tibilis*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 370–371)

♀ Holotypus, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**schirmeri** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 136)

Syntypen, Columbien, Emerelda, in Sammlung SCHIRMER.  
DEI: 1 ♀ Syntypus, ohne Fundortzettel.

**schultheissi** BREDDIN, 1900 (*Neodius*)  
(Stett. Ent. Ztg. 61, 295–296)

Syntypen, Sumatra, Tebing-tinggi, 10. VIII. 1884, leg. SCHULTHEISS; Tandjong, Morawa, leg. SCHULTHEISS; Indrapura Estate, Deli, Sumatra, leg. SIEMSEN, im Museum Hamburg.  
DEI: Lectotypus, Sumatra, Tebing-tinggi, 10. VIII. 1884, leg. SCHULTHEISS; 2 Paralectotypen, vom selben Fundort, 9. VIII./14. X. 1884; 1 Paralectotypus, Tandjong, Marawa, hiermit festgelegt.

**scutellaris** HORVÁTH, 1925 (*Loxa*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 22, 313)

♀ Holotypus, Brasilia, Santos, 28. X. 1888, im DEI.

**securiger** BREDDIN, 1904 (*Lincus*)  
(Soc. ent. 18, 154)

Syntypen, Bolivia.  
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Bolivia, hiermit festgelegt.

**sericeomicans** BREDDIN, 1903 (*Chrysocoris*)  
(Soc. ent. 18, 58)

Syntypen, Ost Java, Tengger Gebirge, leg. FRUHSTORFER, im DEI.  
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Ost Java, Tengger Gebirge, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**simplex** BREDDIN, 1904 (*Galeacius*)  
(Soc. ent. 19, 49)

Holotypus, Peru, Marcapata, im DEI.

**smaragdus** BREDDIN, 1903 (*Lamprocoris*)  
(Soc. ent. 18, 33)

♂ Holotypus, Malacca, Perak, im DEI.

**solenopsisidis** BREDDIN, 1904 (*Chilocoris*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 48, 408–410)

2 Syntypen, Indien, Bombay, 1900, leg. ASSMUTH, bei *Solenopsis rufa* FERR.  
DEI: Lectotypus, Indien, Bombay, bei *Solenopsis rufa*, leg. ASSMUTH, hiermit festgelegt.

**soror** BREDDIN, 1900 (*Lyramorpha*)  
(Ent. Nachr. 26, 36–37, Fig. 6, 7)

Syntypen, Neu Guinea, Milne Bai, Astrolabe Bai, im DEI; Bongu, im Museum Dresden.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, N. Guinea, Astrolabe Bai, hiermit festgelegt.

**spathuliger** BREDDIN, 1908 (*Lincus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1908, 31–33, Fig. 15, 16)

♀ Holotypus, Peru, Marcapata, im DEI.

**speculator** BREDDIN, 1900 (*Lathraedoesus*)  
(Ent. Nachr. 26, 26–28)

♂ Holotypus, Nova Guinea, FINSCHHAFEN, 1891, im DEI.

**speculatrix** BREDDIN, 1913 (*Dalpada*)

(Arch. Nat. gesch. 78 A, Heft 11, 98)

♂ Holotypus, Siam, Muok Lek, 1000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**stenozygoides** BREDDIN, 1901 (*Murgantia*)

(Soc. ent. 16, 138–139)

Syntypen, Guatemala, San Geronimo, Dep. Escuintla, IX., leg. SARG.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Guatemala, San Geronimo, Dep. Escuintla, IX. 1871, hiermit festgelegt.

**sternalis** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)

(Soc. ent. 13, 123)

Syntypen, Ecuador, Sa. Inéz, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**subcastanea** BREDDIN, 1898 (*Menida*)

(Ent. Nachr. 24, 119–121)

2 ♀♀ Syntypen, Java orientali, Montes Tengger, 4000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, 1 ♀ in Sammlung SCHULTHEISS, 1 ♀ im DEI.

DEI: Lectotypus, Java orient., Montes Tengger, 4000 Fuß, 1890, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**subburneum** BREDDIN, 1909 (*Coptosoma*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 252–254)

♀ Holotypus, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, im DEI.

**subrotunda** BREDDIN, 1908 (*Nezara*)

(Soc. ent. 23, 68–69)

♂ Holotypus, Eritrea, Asmara, im DEI.

**subrotundus** BREDDIN, 1909 (*Geotomus*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 264, Fig. 4)

Syntypen, Ceylon, Bandarawella, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ceylon, Bandarawella, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**sumatranus** BREDDIN, 1904 (*Atelides*)

(Wien. Ent. Ztg. 23, 18–19)

♀ Holotypus, Sumatra, Battak Gebirge, im DEI.

**sundanus** BREDDIN, 1913 (*Hermolaus*)

(Arch. Nat. gesch. 78 A, Heft 11, 101–102)

♀ Holotypus, Sumbawa, im DEI.

DEI: 1 Exemplar, ohne Fundortangabe, vielleicht Type.

**sundanus** BREDDIN, 1902 (*Picromerus*)

(Wien. Ent. Ztg. 21, 96–97)

Syntypen, Java, Pengalengan; Sukabumi, leg. FRUHSTORFER; im Museum Hamburg und im DEI.

DEI: Lectotypus, Java occident., Sukabumi, 2000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**taprobanensis** BREDDIN, 1909 (*Eusarcoris*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 273–275, Fig. 9)

Syntypen, Ceylon, Kanthaley, Horrowapotam; Mihintale; Anuradhapura; Colombo, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, Ceylon, Horrowapotam, leg. HORN; 2 Paralectotypen, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Kanthaley, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Mihintale, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Colombo, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**tenuicornis** BREDDIN, 1909 (*Ochlerus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1909, 626–627, Fig. 14, 15)

♀ Holotypus, Venezuela, im DEI.

**tenuispinum** BREDDIN, 1903 (*Dichobothrium*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 209–210)

Syntypen, West Java, Gede Gebirge, 8000 Fuß, VIII. 1902, leg. FRUHSTORFER, im DEI und Museum Berlin.

DEI: Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**teretispinus** BREDDIN, 1904 (*Sabaesus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 9)

♀ Holotypus, Sumbawa, im DEI.

**terricolor** BREDDIN, 1900 (*Paramenestheus*)  
(Ent. Nachr. 26, 21–22)

Syntypen, Australia, Richmond, New South Wales, im DEI.

DEI: Lectotypus, N. S. Wales, hiermit festgelegt.

**teucer** BREDDIN, 1905 (*Eusthenes*)  
(Beih. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 22 (2), 116)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Ost Java, Tengger Gebirge, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ost Java, Tengger Gebirge, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**tonkinensis** BREDDIN, 1904 (*Gonopsis*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 19)

♂ Holotypus, Central Tonkin, Chiem-Hoa, VIII.–IX., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**trabeatus** BREDDIN, 1905 (*Chrysocoris*)  
(Soc. ent. 19, 187)

Syntypen, Mindanao; Palawan.

DEI: 1 Syntypus, Palawan, Ostabhang.

**trabecula** BREDDIN, 1907 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1907, 331–332, Fig. 4, 5)

Syntypen, Surinam; Britisch Guayana, Mallali; im DEI.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Surinam; 1 Paralectotypus, Mallali, Br. Guiana; von LUTZ untersucht und ausgezeichnet, hiermit festgelegt.

**trabifera** BREDDIN, 1900 (*Carbula*)  
(Stett. Ent. Ztg. 61, 302–303)

Holotypus, Soekaranda, Sumatra; Paratypen, Malacca, Perak; Ins. Banguay.

DEI: 3 Paratypen, Malacca, Perak.

**tragelaphus** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♀ Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI.

*tragulus* BREDDIN, 1903 (*Edessa*)

(Soc. ent. 18, 139)

♀♀ Syntypen, Peru, Bolivia.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Bolivia; 1 ♀ Paralectotypus, Peru, Amazonas, hiermit festgelegt.

*translineatus australensis* HEINZE, 1935 (*Brachyplatys*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1935, 203–204, Fig. 5, 6)

Typen, 2 ♀♀, Kap York, Australien, im Museum Berlin; 1 ♀ Nord Queensland, im DEI.

DEI: 1 ♀, als Paratypus ausgezeichnet, Queensland.

*triconcava* MCATEE & MALLOCH, 1933 (*Galgupha*)

(Ann. Carnegie Mus. 21, 269, Fig. 107)

♂ Holotypus, Sapucay, Paraguay, leg. FOSTER, im U. S. N. M.; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Amaz. Str.; 1 Paratypus, Brasilien, São Paulo.

*truncaticornis* BREDDIN, 1904 (*Ochrorrhaca*).

(Wien. Ent. Ztg. 23, 3–4)

♀ Holotypus, Tonkin, Mauson Gebirge, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*ulives* BREDDIN, 1899 (*Eusthenes*)

(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 187–188, Fig. 12, 12a)

Syntypen, Java occ., Pengalengan, 4000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im Museum Hamburg und im DEI; Java, im Museum Dresden.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Java occ. Pengalengan, 4000 Fuß, 1893 leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*usambarica* BREDDIN, 1903 (*Tessarotoma*)

(Soc. ent. 18, 107)

♂ Holotypus, Usambara, Nguelo, im DEI.

*validicornis* BREDDIN, 1901 (*Hoplistodera*)

(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 48–49)

Syntypen, S. Celebes, Wawokaraeng (Schreibweise?), leg. FRUHSTORFER; Lompobatang, leg. FRUHSTORFER.

DEI: Lectotypus, Celebes, Lompobatang, leg. FRUHSTORFER; 3 Paratypen, Celebes Bua Kraeng (Schreibweise?), 5000 Fuß, II. 1896, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*vanduzeei* BARBER & SAILER, 1953 (*Amaurochrous*)

(Journ. Wash. Acad. Sci. 43, 160–162, Fig. 13, 14, 43–48)

♂ Holotypus, 12 ♂♂, 18 ♀♀, Paratypen, Bay Farm Island, Alameda County, California, 25. II. 1939, leg. HAGEN, im C. A. S.; 1 ♂, 2 ♀♀, Paratypen, vom selben Fundort, 11. XI. 1938, leg. BARR; 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Millbrae, California, 25. VIII. 1918, leg. VAN DUZEE; 1 ♂ Paratypus, Los Angeles, Calif., COQUILLET.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Bay Farm Island, Alameda Co Cal., 25. II. 1939, leg. HAGEN.

*varians* BREDDIN, 1899 (*Aspideurus*)

(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 189–190)

Syntypen, Sumbawa, im DEI.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Sumbawa, hiermit festgelegt.

*ventralis* BREDDIN, 1903 (*Erachteus*)

(Soc. ent. 18, 115)

♂♂ Syntypen, Usambara, Nguelo, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Usambara, Nguelo, hiermit festgelegt.



**verhoeffi** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1904, 149)

♀ Holotypus, Columbia, Cauca, im DEI.

**vernica** BREDDIN, 1904 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 178)

♀ Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

**vexillum** BREDDIN, 1903 (*Brachystethus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 371–372)

♂ Holotypus, Bolivien, im DEI.

**vicarians** BREDDIN, 1904 (*Prionocompastes*)  
(Wien. Ent. Ztg. 23, 14–15)

♀ Holotypus, Ost Java, Tengger Gebirge, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**viridinigra** BREDDIN, 1901 (*Halyomorpha*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 43–44)

♀ Holotypus, Celebes, Lembongpangi, II. 1895, leg. SARASIN, im DEI.

**viridiventris** BREDDIN, 1903 (*Chrysocoris*)  
(Soc. ent. 18, 74–75)

♂ Holotypus, Flores, im DEI.

**virilis** MCATEE & MALLOCH, 1933 (*Allocoris*)  
(Ann. Carnegie Mus. 21, 387–388, Fig. 231, 254)

♂ Holotypus, Cedar Ranch, Ariz., im U. S. N. M.; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Lindsay, Calif., 24. VI. 1909, leg. DAVIDSON; 1 Paratypus, Caliente, Calif., 19. IV. 1907.

**vollenhoveni** BREDDIN, 1902 (*Cantheona*)  
(Wien. Ent. Ztg. 21, 96)

♀♀ Syntypen, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, V.–VI. 1896, leg. FRUHSTORFER; Java, Mons Gede, 8000 Fuß, VIII. 1892, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: Lectotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, V.–VI. 1896, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**zebu** BREDDIN, 1903 (*Edessa*)  
(Soc. ent. 18, 139)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, im DEI.

### Wahrscheinlich nicht beschrieben!

**boliviana** BREDDIN (*Galedanta*)

DEI: 1 Exemplar, Bolivia, als „Paratypus“ ausgezeichnet.

**conciliator** BREDDIN (*Padaeus*)

DEI: 1 Exemplar, Venezuela, als „Type“ ausgezeichnet.

**effrenata** BREDDIN (*Mormidea*)

DEI: 1 Exemplar, Minas Geraes, Brasilien, als „Typus“ ausgezeichnet.

*fasciata* BREDDIN (*Nezara*)

DEI: 2 Exemplare, Rio Grande do Sul, als „Typus“ ausgezeichnet.

*flaveola* BREDDIN (*Mormidea*)

DEI: 4 Exemplare, Brit. Guiana, Mallali, IV./V., als „Typus“ ausgezeichnet.

*grantiosula* BREDDIN i. l. (*Mormidea*)

DEI: 1 Exemplar, Espirito Santo, Brasilien, als „n. sp. i. l.“ ausgezeichnet.

*hebes* BREDDIN (*Peromatus*)

DEI: 1 Exemplar, Costa Rica, Chiriqui, als „Typus“ ausgezeichnet.

*illuminatum* BREDDIN (*Stenozygum*)

DEI: 1 Exemplar, Nord Celebes, Toli-Toli, XI.—XII. 1895, leg. FRUHSTORFER; 1 Exemplar, Sula Mangoli, X.—XII., leg. FRUHSTORFER, als „Type“ ausgezeichnet.

*jheringi* BREDDIN (*Euschistus*)

DEI: 1 Exemplar, Rio Grande do Sul, als „Type“ ausgezeichnet.

*jogulator* BREDDIN (*Podisus*)

DEI: 1 Exemplar, Peru, Amazonas, als „Typus“ ausgezeichnet.

*laticeps* BREDDIN (*Mattiphus*)

DEI: 1 Exemplar, Mindanao; 1 Exemplar, Philippinen, leg. SEMPER, als „Typus“ ausgezeichnet.

*laticor* BREDDIN (*Peromatus*)

DEI: 2 Exemplare, Espirito Santo; 1 Exemplar, S. Paolo, Brasilien, als „Typus“ ausgezeichnet.

*maculifera* BREDDIN (*Halyomorpha*)

DEI: 1 Exemplar, Celebes, „n. sp.“ ausgezeichnet.

*majusculus* BREDDIN (*Peromatus*)

DEI: 1 Exemplar, Bahia, als „Typus“ ausgezeichnet.

*mendax* BREDDIN (*Oncocoris*)

DEI: 1 Exemplar, Sydney, „n. sp.“ ausgezeichnet.

*modesta* SCHOUTEDEN (*Menida*)

DEI: 2 Exemplare, Kamerun, leg. CONRADT, „n. sp.“ ausgezeichnet.

*nigritula* BREDDIN (*Mormidea*)

DEI: 1 Exemplar, Bolivia, als „Typus“ ausgezeichnet.

*obscurus* BREDDIN (*Peromatus*)

DEI: 1 Exemplar, Columbien, als „Typus“ ausgezeichnet.

*pallidiventris* BREDDIN (*Plisthenes*)

DEI: 1 Exemplar, Buru, als „Typus“ ausgezeichnet.

*polita* BREDDIN (*Banasa*)

DEI: 1 Exemplar, Peru, als „Typus“ ausgezeichnet.

*pseudocrenator* BREDDIN (*Euschistus*)

DEI: 1 Exemplar, Guatemala, S. Cristobal, als „Typus“ ausgezeichnet.

**schultheissi** BREDDIN (*Canthecona*)

DEI: 2 Exemplare, NO Sumatra, Tebing-Tinggi, 12. VII. 1884, leg. SCHULTHEISS, als „Typus“ ausgezeichnet.

**smaragdula** BREDDIN (*Philia*)

DEI: 1 Exemplar, Buru, leg. FRUHSTORFER, von BREDDIN als Type ausgezeichnet.

**sorex** BREDDIN (*Heteroscelis*)

DEI: 1 Exemplar, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, „n. sp.“ ausgezeichnet.

**speculiger** BREDDIN (*Podisus*)

DEI: 2 Exemplare, Peru Amazonas als „Typus“ ausgezeichnet.

**spinuliger** BREDDIN (*Euschistus*)

DEI: 1 Exemplar, Peru, Yilcanota, „n. sp.“ ausgezeichnet.

**stigmatica** BREDDIN (*Nezara*)

DEI: 2 Exemplare, Paraguay, als „Typus“ ausgezeichnet.

**strenua** BREDDIN (*Mormidea*)

DEI: 1 Exemplar, Bolivia, als „Typus“ ausgezeichnet.

**stupida** BREDDIN (*Mormidea*)

DEI: 1 Exemplar, Columbia, als „n. sp.“ ausgezeichnet.

**subangusta** BREDDIN (*Nezara*)

DEI: 2 Exemplare, Peru, Amazonas, als „Typus“ ausgezeichnet.

**subcarinatus** BREDDIN (*Peromatus*)

DEI: 1 Exemplar, Chiriqui; 1 Exemplar, Mallali, Br. Guiana, als „Typus“ ausgezeichnet.

**sulanus** BREDDIN (*Arvelius*)

DEI: 1 Exemplar, Rio Grande do Sul, als „Typus“ ausgezeichnet.

**terebrans** BREDDIN (*Poriptus*)

DEI: 1 Exemplar, Bolivia, als „n. sp.“ ausgezeichnet.

**transfuga** BREDDIN (*Dichelops*)

DEI: 2 Exemplare, Brasilien, S. Paulo, als „Type“ ausgezeichnet.

**urotaurellus** BREDDIN (*Edessa*)

DEI: 1 Exemplar, Surinam, ex. coll. FRUHSTORFER, als „Typus“ ausgezeichnet.

**variolosa** BREDDIN (*Edessa*)

DEI: 2 Exemplare, Rio Grande do Sul; 1 Exemplar, Espirito Santo, als „Typus“ ausgezeichnet.

**Coreidae****acutispina** BREDDIN, 1903 (*Melucha*)

(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 379)

♀♀ Syntypen, Bolivia, im DEI.

DEI: ♀ Lectotypus, Bolivia, Yungas la Paz, 1000 m; 1 ♀ Paralectotypus, Bolivia, hiermit festgelegt.

**aequatoriana** BREDDIN, 1901 (*Bactrophya*)  
(Soc. ent. 16, 53)

Holotypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH, im DEI.

**andicola** BREDDIN, 1903 (*Lycambes*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 372)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**andinus** BREDDIN, 1901 (*Hypselonotus*)  
(Soc. ent. 16, 25–26)

Syntypen, Ecuador.

DEI: ♂ Lectotypus, Ecuador, Balzapamba, hiermit festgelegt.

**angulicollis** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 211, Fig. 8)

♂♂ Syntypen, Malacca, Perak, im DEI und im Mus. Budapest.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂ Paralectotypus, Malacca, Perak, hiermit festgelegt.

**armillata** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 211–212, Fig. 9)

♂♀ Syntypen, Malacca, Perak, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paralectotypen, Malacca, Perak, hiermit festgelegt.

**aterrimus** BREDDIN, 1903 (*Hyalymenus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 383)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**banausus** BREDDIN, 1903 (*Meluchopetalops*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 378–379)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**bicolor** BREDDIN, 1903 (*Eudarmistus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 382)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**bisbimaculata** BREDDIN, 1906 (*Leptoscelis*)  
(Wien. Ent. Ztg. 25, 200)

♂ Holotypus, Costa Rica, Chiriqui, im DEI.

**blandus** HORVÁTH, 1913 (*Paryphes*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 11, 355)

Syntypen, Costa Rica, San José, im Mus. Budapest und im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Costa Rica, San José, VII.

**brevicornis** BREDDIN, 1908 (*Margus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 27, 68–69)

♂♀ Syntypen, Argentinien, Mendoza, im DEI.

DEI: ♀ Lectotypus, Argentinien, Mendoza, hiermit festgelegt.

**brevirostris** BREDDIN, 1907 (*Cyllarus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 33–34)

♀ Holotypus, Nord Kamerun, Johann Albrechtshöhe, im DEI.

**brevitibialis** BREDDIN, 1909 (*Psilolomia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 293)

♀ Holotypus, Ceylon, Trincomallee, leg. HORN, im DEI.

**brunnea** BREDDIN, 1900 (*Acanthocolpura*)  
(Ent. Nachr. 26, 40–41)

♂♀ Syntypen, N. South Wales, im DEI.

**brunneiventris** BREDDIN, 1903 (*Ctenomelynthus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 375)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**calcarator** BREDDIN, 1904 (*Hyalymenus*)  
(Soc. ent. 18, 148)

Syntypen, Bolivia.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, hiermit festgelegt.

**commutata** HORVÁTH, 1915 (*Pternistria*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 13, 413–414, Fig. 12)

Syntypen, Nova Guinea batavica, Takar, leg. FRUHSTORFER, im DEI; Ins. Jovi, leg. DOHERTY, im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Takar, leg. FRUHSTORFER.

**complus** BREDDIN, 1903 (*Bardistus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 372–373)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**consors** HORVÁTH, 1913 (*Paryphes*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 11, 352, Fig. 2)

Syntypen, Peru, im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Peru.

**conspersipes** BREDDIN, 1901 (*Colpura*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 70–71, Taf. I Fig. 7)

♂ Holotypus, N. Celebes, Matinang, leg. SARASIN, im DEI.

**coxalis** BREDDIN, 1903 (*Ctenomelynthus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 374–375)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, im DEI.

**decipiens** HORVÁTH, 1913 (*Paryphes*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 11, 357–358)

Syntypen, Peru, Sicuani, im Mus. Budapest; Bolivia, im DEI.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Bolivien.

**decoratula** BREDDIN, 1900 (*Typhlocolpura*)  
(Rev. Ent. 19, 195)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, S. Celebes, Bua Kraeng, 5000 Fuß, II. 1896, leg. FRUHSTORFER; 1 Paralectotypus, S. Celebes, Lompa Battau, 3000 Fuß, III. 1896, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**distinguendus** BREDDIN, 1901 (*Petalops*)  
(Soc. ent. 16, 41)

♀ Holotypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH, im DEI.

**edax** BREDDIN, 1900 (*Homalocolpura*)  
(Abh. Senckenbg. nat. Ges. 25, 201)

Syntypen, Java meridionalis, im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Java, Tjibodas.

**egregius** HORVÁTH, 1913 (*Paryphes*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 11, 349–350)

♂ Holotypus, Peru, Pebas, im DEI.

**erubescens** BREDDIN, 1901 (*Calamocoris*)  
(Soc. ent. 16, 52–53)

Syntypen, Ecuador.

DEI: Lectotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**euryptera** BREDDIN, 1903 (*Prioptychomia*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 221–222)

♂♂ Syntypen, Tonkin, Mauson Gebirge, 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**farinulenta** BREDDIN, 1899 (*Mictis*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 166–167)

♀ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, V. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**femorata** BREDDIN, 1901 (*Phthia*)  
(Soc. ent. 16, 41)

♀ Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI.

**gracilis** BREDDIN, 1901 (*Leptopetalops*)  
(Soc. ent. 16, 52)

♂ Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI.

**guttatipes** BREDDIN, 1901 (*Colpura*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 68–70, Taf. I Fig. 5)

♂ Holotypus, Celebes, Posso See und Umgebung, II. 1895, leg. SARASIN, im DEI.

**haenschi** BREDDIN, 1901 (*Cebrenis*)  
(Soc. ent. 16, 26)

Syntypen, Ecuador.

DEI: ♂ Lectotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**haenschi** BREDDIN, 1901 (*Laminiceps*)  
(Soc. ent. 16, 42)

♀ Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI.

**hilaris** BREDDIN, 1903 (*Stenoscelidia*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 376)

♀ Holotypus, Bolivia, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, ohne Fundortangabe.

**hoplomachus** BREDDIN, 1909 (*Cletus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 291)

♂ Holotypus, Ceylon, Negombo, leg. HORN, im DEI.

**horni** SCHMIDT, 1926 (*Sundarus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1926, 143)

Syntypen, Brasilien, Matto Grosso, Cayubá, im Mus. Stettin.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**horniana** KIRITSHENKO, 1938 (*Haploprocta*)  
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 5)

♀ Holotypus, Hindukusch, Bubruk, Kti-Tal, 2620 m, 19. VI. 1935, leg. SCHEIBE, im DEI.

**imbellis** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 209, Fig. 5)

Syntypen, Malacca, Perak, im DEI und Mus. Budapest.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Malacca, Perak, hiermit festgelegt.

**inca** BREDDIN, 1901 (*Sudarum*)  
(Soc. ent. 16, 41)

♀ Holotypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH, im DEI.

**inermicollis** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 210, Fig. 6)

Syntypen, Ins. Banguay bei Borneo, im DEI und im Mus. Budapest.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Banguay bei Borneo, hiermit festgelegt.

**inermis** BREDDIN, 1912 (*Calamocoris*)  
(Arch. Nat. gesch. 78 A, Heft 6, 87–89)

♂♂ Syntypen, Colombia, Rio Vitaco, Kamm der West-Cordillere, 2500 m.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**inornata** BREDDIN, 1902 (*Zicca*)  
(Soc. ent. 17, 2–3)

Syntypen, Ecuador.

DEI: Lectotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**jucunda** BREDDIN, 1904 (*Anasa*)  
(Soc. ent. 18, 147)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**juvenca** HORVÁTH, 1915 (*Pternistria*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 13, 405–406, Fig. 4)

Syntypen, Nova Guinea germanica, im Mus. Budapest und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea germanica.

**laticornis** BREDDIN, 1903 (*Derepteryx*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 222–223)

♀♀ Syntypen, Tonkin, Mauson Gebirge, 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**lauta** BREDDIN, 1903 (*Malvana*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 380)

♀♀ Syntypen, Bolivia, im DEI.

DEI: ♀ Lectotypus, Bolivien; 1 ♀ Paralectotypus, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, leg. ROLLE, hiermit festgelegt.

**lepida** BREDDIN, 1909 (*Leptocoris*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 293–294, Fig. 23)

♂♂ Syntypen, Ceylon, Negombo, leg. HORN; Malacca; im DEI.

DEI: Lectotypus, ohne Fundortangabe (von BREDDIN als Typus ausgezeichnet), hiermit festgelegt.

**limbativentris** BREDDIN, 1901 (*Leptoscelis*)  
(Soc. ent. 16, 25)

Syntypen, Ecuador.

DEI: ♀ Lectotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**longulus** BREDDIN, 1899 (*Acantholybas*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 168–169, Fig. 5)

Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**loratus** BREDDIN, 1901 (*Hypsilonotus*)  
(Soc. ent. 16, 25)

Syntypen, Bolivia.

DEI: ♂ Lectotypus, Bolivien, Coroico; 1 ♀ Paralectotypus, Bolivien, hiermit festgelegt.

**luteifusula** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 204–206, Fig. 1)

Syntypen, Sumatra, Tebbing-tinggi, II./IX., leg. SCHULTHEISS, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, NO. Sumatra, Tebing-tinggi, 8. IX. 1884, leg. SCHULTHEISS; 1 ♀ Paralectotypus, vom selben Fundort, 11. II. 1884, hiermit festgelegt.

**manca** BREDDIN, 1900 (*Pachycolpura*)  
(Ent. Nachr. 26, 39–40)

2 Syntypen, N. South Wales, im DEI.

**marmoratus** BREDDIN, 1900 (*Brachylybas*)  
(Abh. Senckenbg. nat. Ges. 25, 150–152, Taf. 9 Fig. 8)

Syntypen, Halmahera, Oba (42, 43); Batjan (145), leg. KÜKENTHAL.

DEI: 1 Syntypus, Halmahera, Oba, 1894, leg. KÜKENTHAL.

**masculus** BREDDIN, 1901 (*Riptortus*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 114)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, N. Celebes, Toli-Toli, XI.–XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**matronalis** BREDDIN, 1903 (*Leptoscelis*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 380)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, leg. ROLLE, im DEI.

**mimeticum** BREDDIN, 1904 (*Trachelium*)  
(Soc. ent. 18, 147–148)

♀♀ Syntypen, Bolivia.

DEI: 2 Syntypen, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m.

**moerens** HORVÁTH, 1915 (*Pternistria*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 13, 415–416, Fig. 14)

Syntypen, N. Guinea germanica, im Mus. Budapest; Nova Guinea batavica, Arfak, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Arfak, leg. FRUHSTORFER.

**molitor** BREDDIN, 1898 (*Molchina*)  
(Jahrb. Nat. Vereins Magdeb. 1898, 151–153)

♀ Holotypus, Bolivia, im DEI.

**nigrifusula** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 206)

Syntypen, Ins. Banguey bei Borneo, im DEI und im Mus. Budapest; Borneo, leg. KÜKENTHAL, im Mus. Frankfurt.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂ Paralectotypus, Banguey bei Borneo, hiermit festgelegt.



**nigriventris** BREDDIN, 1904 (*Nematopus*)  
(Soc. ent. 18, 147)

♂ Holotypus, Ecuador, Napo, leg. HAENSCH, im DEI.

**nigrolimbatus** BREDDIN, 1901 (*Calamocoris*)  
(Soc. ent. 16, 52)

Syntypen, Ecuador, Bolivia.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Bolivien, hiermit festgelegt.

**nitidula** BREDDIN, 1913 (*Leptocoris*)  
(Arch. Nat. gesch. 78 A, Heft 11, 104–105)

♀♀ Syntypen, Süd China, Kingh-siang.

DEI: 1 Exemplar, Süd China, Ping Hsiang, Typus ?

**nugax** BREDDIN, 1906 (*Stenocolpura*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 50, 55–56, Fig. 10)

♂ Holotypus, Java, Tjibodas, im DEI.

**ornaticornis** BREDDIN, 1909 (*Petillia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 284–286)

♂ Holotypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI.

**ornativentris** BREDDIN, 1900 (*Homoocerus*)  
(Abh. Senckenbg. nat. Ges. 25, 149–150, Taf. 9 Fig. 5)

♂ Holotypus, Borneo, Baram flumen (167), 1894, leg. KÜKENTHAL, im DEI.

**pedestris** BLÖTE, 1936 (*Hygia*)  
(Zool. Mededel. 19, 39–40)

Holotypus, zahlreiche Paratypen, Kosempo, Formosa, VIII. 1908, leg. SAUTER; zahlreiche Paratypen, Hoozan, Formosa, 1910, leg. SAUTER.

DEI: 10 Paratypen, Kosempo, Formosa, VIII. 1908, leg. SAUTER; 8 Paratypen, Hoozan, Formosa, 7. IX. 1910, leg. SAUTER.

**persimilis** BREDDIN, 1903 (*Holymenia*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 382–383)

Syntypen, Bolivia, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, hiermit festgelegt.

**peruviana** BREDDIN, 1901 (*Bactrophyta*)  
(Soc. ent. 16, 53)

Holotypus, Peru, Callanga.

**proletarius** BREDDIN, 1903 (*Petalops*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 377–378)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**quadrituberculata** BREDDIN, 1899 (*Clavigralla*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 169–171)

♂ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, V.–VI. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**robustior** BREDDIN, 1901 (*Cletus*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 73)

♂ Holotypus, S. Celebes, Wawokaraeng (Schreibweise ? Bua Kraeng ?) 5000 Fuß, II. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*rubiginosa* BREDDIN, 1904 (*Holymenia*)  
(Soc. ent. 18, 147)

♀ Holotypus, Rio Grande do Sul, im DEI.

*ruficornis* BREDDIN, 1903 (*Melucha*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 379–380)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, im DEI.

*rufipes* BREDDIN, 1904 (*Nematopus*)  
(Soc. ent. 18, 147)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

*saepifera* BREDDIN, 1901 (*Leptoscelis*)  
(Soc. ent. 16, 25)

Syntypen, Ecuador.

DEI: ♂ Lectotypus, Ecuador, Napo, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

*sargi* BREDDIN, 1904 (*Lycambes*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 48, 306–307)

♂♂ Syntypen, Guatemala, San Geronimo, leg. SARG, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂ Paralectotypus, Guatemala, San Geronimo, hiermit festgelegt.

*schultheissi* BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 214–215)

Holotypus, Sumatra, Tandjong Kasso, leg. SCHULTHEISS, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, Sumatra, Tandjong Kasso, leg. TRESCHER.

*scrutatrix* BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 207–208)

♂ Holotypus, Banguay bei Borneo, im DEI.

*sealineata* HORVÁTH, 1915 (*Pternistria*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 13, 420–421, Fig. 18)

Syntypen, N. Guinea, Dorey, im DEI; Ins. Aru, Trangan, leg. MERTON, im Museum Senckenberg.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Dorey, leg. FRUHSTORFER.

*smaragdus* BREDDIN, 1901 (*Paryphes*)  
(Soc. ent. 16, 41)

♀ Holotypus, Ecuador, Aquamo, leg. HAENSCH, im DEI.

*sobrina* HORVÁTH, 1915 (*Pternistria*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 13, 407–408, Fig. 6)

Syntypen, N. Guinea, Finschhafen, 1891, leg. FRUHSTORFER, im DEI und im Mus. Budapest.

DEI: 3 Syntypen, Neu Guinea, Finschhafen, leg. FRUHSTORFER.

*spectabilis* BREDDIN, 1901 (*Leptocoris*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 114–115)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, N. Celebes, Toli-Toli, XI.–XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*speculatrix* BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Abh. Senckenbg. nat. Ges. 25, 152–153, Taf. 9, Fig. 6)

Syntypen, ♀ Borneo, Baram flumen (171, 172), leg. KÜKENTHAL; ♂ Sumatra, Tandjong Kasso, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, NO. Sumatra, Tandjong Kasso, leg. TRESCHER, hiermit festgelegt.

**spinulicollis** BREDDIN, 1909 (*Pendulinus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 287–288)

♂ Holotypus, Ceylon, Matala, leg. HORN, im DEI.

**stenocephala** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 212–213)

♂♀, Syntypen, Malacca, Perak, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Malacca, Perak, hiermit festgelegt.

**stenocephaloides** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 213–214)

♂♀ Syntypen, Malacca, Perak, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Malacca, Perak, hiermit festgelegt.

**subferrugineus** BREDDIN, 1903 (*Cochrus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 381)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**sulcicrus** BREDDIN, 1900 (*Sciophyrus*)  
(Rev. Ent. 19, 198–199)

Syntypen, Neu Guinea, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, 3 ♀♀, 1 ♂♂ Paralectotypen, Neu Guinea, hiermit festgelegt.

**superbus** BREDDIN, 1903 (*Laminiceps*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 376–377)

♀ Holotypus, Bolivia, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, ohne Fundortangaben.

**tibialis** BREDDIN, 1904 (*Holymenia*)  
(Soc. ent. 18, 147)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, leg. ROLLE, im DEI.

**tonsor** BREDDIN, 1909 (*Xyrophoreus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 283–284)

Syntypen, Nord Ceylon, leg. FRUHSTORFER; Ceylon, Kanthaley, leg. HORN, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, Ceylon, Kanthaley, leg. HORN; 3 ♂♂ Paralectotypen, Nord Ceylon, VI. 1889, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**tricolor** BREDDIN, 1901 (*Hypselonotus*)  
(Soc. ent. 16, 25)

Syntypen, S. Paolo.

DEI: ♂ Lectotypus, 3 ♀♀ Paralectotypen, Brasilien, S. Paolo, hiermit festgelegt.

**tristis** BREDDIN, 1901 (*Petillia*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 66–67)

♂♀ Syntypen, Celebes, Mapane und Umgebung, II. 1895, leg. SARASIN.

DEI: ♀ Lectotypus, Celebes, Mapane und Umgebung, II. 1895, leg. SARASIN, hiermit festgelegt.

**triumphator** BREDDIN, 1903 (*Petalops*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 376)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**tuberculicollis** BREDDIN, 1900 (*Colpura*)  
(Rev. Ent. 19, 210–211, Fig. 7)

Syntypen, Malacca, Perak; Sumatra, leg. SCHULTHEISS; Java; im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Malacca, Perak; 1 Paralectotypus, Sumatra, Tebingtinggi, leg. SCHULTHEISS, hiermit festgelegt.

**vedda** KIRKALDY, 1902 (*Distantidea*)

(Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 14, 304–305, Taf. A Fig. 15, Taf. C Fig. 3)

Ceylon, Kandy, XI. 1897, leg. GREEN & KIRKALDY, Typus ♂♀ im British Museum.  
DEI: 1 Paratypus, Ceylon.**viduus** BREDDIN, 1901 (*Laminiceps*)

(Soc. ent. 16, 42)

♀ Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI.

**virago** BREDDIN, 1901 (*Petalops*)

(Soc. ent. 16, 41–42)

♀ Holotypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH, im DEI.

**v-luteum** BREDDIN, 1903 (*Stenometaopodus*)

(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 373–374)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

**aberrans** BREDDIN (*Hypsilonotus*)

DEI: 1 ♂ Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, leg. ROLLE; 1 ♀ Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, als Typen ausgezeichnet.

**angulata** BREDDIN (*Petillia*)

DEI: 1 Ex. Java, als Typus ausgezeichnet.

**armatula** BREDDIN (*Anasa*)

DEI: 1 Ex. Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, n. sp. ausgezeichnet.

**horni** BREDDIN (*Tenosius*)

DEI: 1 Ex. Ceylon, Kandy, leg. HORN, als Typus ausgezeichnet.

**minor** BREDDIN (*Choerommatus*)

DEI: 1 Ex. Amber Gebirge, als Typus ausgezeichnet.

**obscura** BREDDIN (*Amblypelta*)

DEI: 1 Ex. Key Insel, n. sp. ausgezeichnet.

**striata** BREDDIN (*Petillia*)

DEI: 1 Ex. Sumatra, als Typus ausgezeichnet.

**Aradidae****hesperus** PARSHLEY, 1921 (*Aradus*)

(Trans. Amer. Ent. Soc. 47, 71–72, Taf. IV Fig. 35)

♀ Holotypus, Paratypen Arizona, im U. S. N. M., Nr. 24076; ♀ Paratypus, Colorado; ♂♀ Paratypen, Williams, Arizona, 7. VI./26. V., leg. BARBER & SCHWARZ, im U. S. N. M. und in Sammlung PARSHLEY.  
DEI: 1 Paratypus, Ari.**Dysodiidae**

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

**haenschi** BREDDIN (*Brachyrhynchus*)

DEI: 1 Ex. Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, n. sp. ausgezeichnet.

*horni* KIRITSHENKO (*Mezira*)

DEI: 2 Ex. Kashmir, leg. ROST, als Typen ausgezeichnet.

*lepidulus* BREDDIN (*Brachyrhynchus*)

DEI: 1 Ex. Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, n. sp. ausgezeichnet.

**Berytidae***eckerteini* JOSIFOV, 1959 (*Gampsocoris*)

(Fragmenta balcanica II (18), 155–158, Fig. 1, 2, 5)

♂ Holotypus, Paratypen; 7 ♂♂, 7 ♀♀, Athen, 26. VII. 1958; 14 ♂♂, 15 ♀♀, Delphi, 6. VIII. 1958; 3 ♂♂, 3 ♀♀, Tymphaki, Kreta, 29.–31. VII. 1958; 3 ♀♀, Chania, Kreta, 4. VIII. 1958, leg. ECKERLEIN. Holo- und Paratypen, in Sammlung ECKERLEIN, Paratypen in Sammlung JOSIFOV und im Zool. Mus. Sofia.

DEI: 1 Paratypus, Graecia, Delphi, 6. VIII. 1958, leg. ECKERLEIN.

*horni* BREDDIN, 1907 (*Capyella*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 37)

♂ Holotypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI.

*pertenerum* BREDDIN, 1907 (*Megalomerium* ?)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 37–38)

Syntypen, Ceylon, Negombo, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ceylon, Negombo, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**Lygaeidae***albipes* BREDDIN, 1903 (*Colobasiastes*)

(Soc. ent. 18, 131, 1. XII. 1903)

(ausführliche Beschreibung, Wien. Ent. Ztg. 22, 247, 20. XII. 1903)

Syntypen, Bolivia, Yungas de la Paz, im DEI.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, hiermit festgelegt.

*analis* BREDDIN, 1904 (*Colobasiastes*)

(Wien. Ent. Ztg. 23, 249–250)

Syntypen, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI; Peru, Marcapata, im Mus. Budapest.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, hiermit festgelegt.

*burmanus singalensis* BREDDIN, 1907 (*Teracrius*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 220)

Syntypen, Ceylon, Weligama, Putalam, Anuradhapura, leg. HORN.

DEI: Lectotypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Weligama, leg. HORN; 2 Paralectotypen, Ceylon Puttalam, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Negombo, leg. HORN, von SLATER, Phil. Journ. Sci. 84, 123–125, festgelegt. Ursprünglich als var. *singalensis* beschrieben, von SLATER l. c. als ssp. aufgefaßt.

*carinulatus* BREDDIN, 1907 (*Lethaeus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 214–215)

Syntypen, Ceylon, Nalanda; Anuradhapura, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**collaris** BREDDIN, 1907 (*Pyrrhobaphus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 43)

♀♀ Syntypen, Ceylon, Matala; Paradna, leg. HORN, im DEI.

DEI: ♀ Lectotypus, Ceylon, Matala, leg. HORN; 1 ♀ Paralectotypus, Ceylon, Paradna, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**grus** MILLER, 1948 (*Phibalocoris*)  
(Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 12, 1, 683–684, Fig. A, B)

♀ Holotypus, Borneo; 1 ? (ohne Abdomen), Sarawak (Druckfehler), ohne Datum.

DEI: ♀ Holotypus, Borneo; 1 Paratypus, Sumatra.

**irrovatus** HORVÁTH, 1892 (*Henestaris*)  
(Rev. Ent. Caen 11, 136–137)

Syntypen, ♂♀, Palavas, 12. VIII. 1891; La Nouvelle, in Sammlung PUTON; Cette im Mus. Geneve; Avignon in Sammlung NICOLAS; Hyeres in Sammlung ABEILLE DE PERRIN.

DEI: 1 Syntypus, Gall. mer., Palavas.

**croceosignatus** BREDDIN, 1901 (*Caenocoris*)  
(Soc. ent. 16, 1)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechtshöhe, im DEI.

**dentifer** BREDDIN, 1901 (*Caenocoris*)  
(Soc. ent. 16, 1–2)

♀♀ Syntypen, Molukken, Sula Besi, leg. DOHERTY.

DEI: ♀ Lectotypus, Sula Besi, leg. DOHERTY, hiermit festgelegt.

**dimidiatus** BREDDIN, 1907 (*Caenocoris*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 45)

Syntypen, Ceylon, Negombo, leg. HORN, im DEI; Ceylon, leg. DÖNITZ, im Mus. Berlin.

DEI: Lectotypus, Ceylon, Negombo, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**diminutum** HORVÁTH, 1898 (*Holocranum*)  
(Rev. Ent. Can 17, 68–69)

Syntypen, Turkestan, Taschkend, leg. REITTER.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan.

**elongatus** BREDDIN, 1901 (*Astacops*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 115)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, Tomohon & Rurukan, 1894, designiert von SCUDDER.

**eros** BREDDIN, 1904 (*Acroleucus*)  
(Soc. ent. 18, 148)

♀ Holotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, im DEI.

**fenestellus** BREDDIN, 1901 (*Geocoris*)  
(Soc. ent. 16, 10–11)

Syntypen, Borneo, Kina Balu.

DEI: Lectotypus, Borneo, Kina Balu, hiermit festgelegt.

**flavidus** BREDDIN, 1903 (*Colobasiastes*)  
(Soc. ent. 18, 131)

Syntypen, Bolivia.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, hiermit festgelegt.

**fossor** BERGROTH, 1914 (*Macropes*)  
(Ent. Mitt. 3, 356–357)

♀ Holotypus, Formosa, Kosempo, VII. 1908, leg. SAUTER, im DEI.

**fulvicollis** BREDDIN, 1903 (*Colobasiastes*)  
(Soc. ent. 18, 131)

Syntypen, Bolivia.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, 1 ♀, Paralectotypen, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, hiermit festgelegt.

**grisescens** BREDDIN, 1901 (*Caenocoris*)  
(Soc. ent. 16, 2)

♀ Holotypus, Key Insel, im DEI.

**iberica** HORVÁTH, 1898 (*Apterola*)  
(Rev. Ent. Caen 17, 283–284)

♂♂, ♀♀, Syntypen, Espagne, Ciudad-Real, leg. J. M. DE LA FUENTE À POZUELO DE CALA-TRAVA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**kreyenbergi** BREDDIN, 1906 (*Dieuches*)  
(Stett. Ent. Ztg. 67, 328–329)

Syntypen, Inneres Süd China, Pinghsiang, leg. KREYENBERG.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Pinghsiang, leg. KREYENBERG, hiermit festgelegt.

**krügeri** BREDDIN, 1903 (*Colobathristes*)  
(Wien. Ent. Ztg. 22, 245–246)

♂ Holotypus, West Java, Kagok, leg. KRÜGER, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, von GHOURI festgestellt.

**laticeps** BREDDIN, 1900 (*Astacops*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 170–171)

Syntypen, N. S. Wales.

DEI: Lectotypus, N. S. Wales, designiert von SCUDDER.

**limbatipennis** BREDDIN, 1899 (*Oxycarenus*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 172–173)

♀ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, V.–VI. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**maior** BREDDIN, 1900 (*Astacops*)  
(Abh. Senckenbg. Nat. Ges. 25, 159–160)

Syntypen, Halmahera, Soah, Konorah (110), leg. KÜKENTHAL.

DEI: 2 Syntypen, Halmahera, Soah konorra, leg. KÜKENTHAL.

**maximus** BREDDIN, 1901 (*Caenocoris*)  
(Soc. ent. 16, 2)

Holotypus, Celebes, Macassar, im DEI.

**mimula** BREDDIN, 1907 (*Pamera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 206–207)

♂ Holotypus, Ceylon, Mihintale, leg. HORN, im DEI.

*miriformis* BREDDIN, 1905 (*Pachygrontha*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 22, 213–214)

♀♀ Syntypen, Ins. Banguay.

DEI: Lectotypus, Banguay bei Borneo, von SLATER, Phil. Journ. Sci., 84, 46–47, festgelegt.

*modestus* HORVÁTH, 1889 (*Dieuches*)  
(Term. Füzetek 12, 36)

♂♀ Syntypen, Kashmir.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangabe.

*nanulus* BREDDIN, 1907 (*Cymus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 38)

♂(?) Holotypus, Ceylon, Negombo, leg. HORN, im DEI.

*nanus* BREDDIN, 1900 (*Microcaenocoris*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 171–172)

Syntypen, Sumbawa.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Sumbawa, hiermit festgelegt.

*nesiotes* BREDDIN, 1912 (*Oncopeltus*)  
(Arch. Nat. gesch. 78 A, Heft 6, 83)  
(vid. Slat.-Kat. p. 163: *atorufus nesiotes* BREDDIN, 1912)\*

Syntypen, Insel Key; Nova Guinea; Insel Damma.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Finschhafen, 1891, leg. FRUHSTORFER; 1 Syntypus, Neu Guinea, Arfak.

*nigriceps* BREDDIN, 1901 (*Caenocoris*)  
(Soc. ent. 16, 2)

♀ Holotypus, Celebes, Bua-Kraeng, 5000 Fuß, II. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*nigrifrons* BREDDIN, 1903 (*Colobasiastes*)  
(Soc. ent. 18, 131, I. XII. 1903)  
(ausführliche Beschreibung Wien. Ent. Ztg. 22, 247, 20. XII. 1903)

Syntypen, Bolivia, Yungas de la Paz, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Bolivien, Yungas de la Paz, hiermit festgelegt.

*nigripennis* HORVÁTH, 1914 (*Oncopeltus*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 12, 658)  
(vid. Slat.-Kat. p. 170: *nigripennis* HORVÁTH, 1914)\*

♀ Holotypus, Insel Key, Tual, leg. ROHDE, im DEI.

*notaticeps* BREDDIN, 1901 (*Astacops*)  
(Wien. Ent. Ztg. 20, 81–82)

Syntypen, Sumbawa, im DEI.

DEI: Lectotypus, Sumbawa, designiert von SCUDDER.

*nuristanicus* KIRITSHENKO, 1938 (*Aphanus*)  
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 6)

♂ Holotypus, Nuristan (Afghanistan), Paprak im Grama Tal, 4. VIII. 1935, leg. SCHEIBE, im DEI.

*oceanicus* USINGER, 1937 (*Nysius*)  
(Proc. Haw. Ent. Soc. 9, 441–442, Fig. 1b)

♂ Holotypus, 28 Paratypen, Jarvis Island, 7. VII. 1935, leg. GRAF; 4 Paratypen, Jarvis Island 25. IV. 1935; 6 Paratypen, Jarvis Island, 26. IV. 1935, im BISHOP Mus.

DEI: 1 Paratypus, Jarvis I., 7. VI. 1935, leg. GRAF.

\* SLATER, J. A., A Catalogue of the Lygaeidae of the World, Vol. 1+2, Storrs, 1964.



**octonotata** BERGROTH, 1914 (*Pamera*)  
(Ent. Mitt. 3, 357–358)

♀ Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER, im DEI.

**picipes** USINGER, 1937 (*Nysius*)  
(Proc. Haw. Ent. Soc. 9, 439–441, Fig. 1a)

♂ Holotypus, Wake Island, 1. VIII. 1923, leg. BRYAN; zahlreiche Paratypen, vom selben Fundort, 31. VII./5. VIII. 1923, leg. BRYAN.

DEI: 1 Paratypus, Wake I., 5. VIII. 1923, leg. BRYAN.

**planus** SLATER & AHMAD, 1965 (*Riggiella*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 57, 430–431, Fig. 2, 5, 9, 16, 21, 24)

♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, Brazil, Jatahy, Goyaz, im DEI; Paratypen, Brazil, Corupa, S. Cath, leg. HANSA HUMBOLDT, X. 1946, im Am. Mus. Nat. Hist. und in Sammlung SLATER.

DEI: Holotypus, Jatahy, Goyaz.

**pothus** BREDDIN, 1904 (*Acroleucus*)  
(Soc. ent. 18, 148)

♀ Holotypus, Ecuador, Baños, leg. HAENSCH, im DEI.

**procericornis** BREDDIN, 1908 (*Dieuches*)  
(Stett. Ent. Ztg. 69, 31–33)

1 ♂, Syntypus, ohne Fundortangabe, wahrscheinlich Sumatra; 1 ♂, 1 ♀, Java, Samanrang, leg. JACOBSON.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangabe.

**procincta** BREDDIN, 1901 (*Pamera*)  
(Soc. ent. 16, 59)

♀♀ Syntypen, Ecuador.

DEI: Lectotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**pseudofemoralis** SLATER, ASHLOCK & WILCOX, 1969 (*Macropes*)  
(Pacific Ins. 11, 684)

Holotypus, ♂, Thailand: Chiangmai, IV.–V. 1958, light trap, leg. NOTANANDO; Paratypen, 17 ♂♂, 14 ♀♀, Thailand: Fundort des Holotypus; Fang, Chiangmai Prov., 17. IV. 1958, leg. PHLOBOEN; ohne Fundort, 1958, leg. IKOMA; Chiangmai, 21. IV. 1958, leg. IKOMA; Chiangmai, 420 m, 28. III. 1958, leg. MAA; Laos: Vientiane, 2.–4. VI. 1960, light trap, leg. S. & L. QUATE; Sayaboury Prov., Sayaboury, 25. III. 1966, Malaise-Falle; im Bishop-Museum, U. S.-National Museum, in Coll. SLATER und HASEGAWA sowie im Museum Bangkok.

DEI: 1 Paratypus, Thailand, Fang Chiangmai, 17. IV. 1958, leg. PHLOBOEN.

**regulus** BREDDIN, 1905 (*Pyrrhobaphus*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 22, 120)

Holotypus, Sumbawa, im DEI.

**robustus** BREDDIN, 1903 (*Colobathristes*)  
(Wien. Ent. Ztg. 22, 246)

♀ Holotypus, Buton, im DEI.

**rufipes** BREDDIN, 1901 (*Astacops*)  
(Wien. Ent. Ztg. 20, 81)

Syntypen, Neu Guinea, Finschhafen, im DEI.

DEI: Lectotypus, Neu Guinea, Finschhafen; 1 Paralectotypus, ohne Fundortangabe, designiert von SCUDDER.

**sarasinorum** BREDDIN, 1901 (*Astacops*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 115)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, Central Celebes, Gegend des Posso Sees, von SCUDDER designiert.

**sauteri** BERGROTH, 1914 (*Ischnodemus*)  
(Ent. Mitt. 3, 357)

♀♀ Syntypen, Formosa Anping, leg. SAUTER.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Formosa, Anping, VI. 1911, leg. SAUTER, von SLATER, ASHLOCK & WILCOX (Pacific Ins. 11, 726; 1969) festgelegt.

**schultheissi** BREDDIN, 1901 (*Caenocoris*)  
(Soc. ent. 16, 2)

Syntypen, Sumatra.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂ Paralectotypus, N. O. Sumatra, Tebing tinggi, 1884, leg. SCHULTHEISS, hiermit festgelegt.

**scutellatus** BREDDIN, 1907 (*Pyrrhobaphus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 43–44)

Syntypen, Ceylon, Anuradhapura, Horrowapatam, Nalanda, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, Ceylon, Nalanda, leg. HORN; 2 Paralectotypen, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Horromapatam, hiermit festgelegt.

**singalensis** BREDDIN, 1907 (*Ninus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 39–40)

♀ Holotypus, Ceylon, Weligama, leg. HORN, im DEI.

**subangustatus** BREDDIN, 1907 (*Dieuches*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 207 „nomen nudum; vid. SLAT.-Kat. p. 1219)

1 Typus, Ceylon, Bandarawella, leg. HORN, im DEI.

**taivanicus** BERGROTH, 1914 (*Hyginus*)  
(Ent. Mitt. 3, 358–359)

♀ Holotypus, Formosa, Hoozan, II. 1910, leg. SAUTER, im DEI.

**tyrannus** BREDDIN, 1899 (*Pyrrhobaphus*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 171)

♀ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**venosus** BREDDIN, 1900 (*Ischnodemus*)  
(Ent. Nachr. 26, 41–42)

Syntypen, Nova Guinea germanica, im DEI.

DEI: Lectotypus, Deutsch Neu Guinea, hiermit festgelegt.

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

**angustatus** BREDDIN (*Astacops*)

DEI: 3 Ex. Nord Celebes, Toli-Toli, XI.–XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.

**brunni** BREDDIN (*Oxycarenum*)

DEI: 2 Ex. Kamerun, Gebirge Victoria, als Typen ausgezeichnet.

**formicaria** BREDDIN (*Plociomera*)

DEI: 1 Ex. Ost Java, Tengger-Gebirge, leg. FRUHSTORFER, als Typus ausgezeichnet.

***luctuosus*** BREDDIN (*Ischnodemus*)

DEI: 2 Ex. Malacca, Perak, als Typen ausgezeichnet.

***perelegans*** BREDDIN (*Beosus*)

DEI: 3 Ex. N. O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, als Typen ausgezeichnet.

***velox*** BREDDIN (*Dieuches*)

DEI: 1 Ex. Pinghsiang, leg. KREYENBERG, als Typus ausgezeichnet.

**Pyrrhocoridae**

***amorosus*** BREDDIN, 1909 (*Antilochus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 296–297)

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, hiermit festgelegt.

***daiacus*** BREDDIN, 1901 (*Dindymus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 20, 84)

15 Syntypen, Insel Banguay, bei Borneo, im DEI.

DEI: Lectotypus, Banguay bei Borneo, hiermit festgelegt

***decolor*** BREDDIN, 1900 (*Dindymus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 173–174)

♂ Holotypus, Nova Guinea orientalis, Milne Bay, im DEI.

***decorus*** BREDDIN, 1901 (*Dysdercus*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 115)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Celebes, Macassar, leg. SARASIN, hiermit festgelegt.

***dubia*** BREDDIN, 1901 (*Physopelta*)  
(Wien. Ent. Ztg. 20, 82)

Syntypen, Nova Guinea, Astrolabe Bai, im DEI.

DEI: Lectotypus, Neu Guinea, leg. SPEYER, hiermit festgelegt.

***femorialis*** SCHMIDT, 1931 (*Acinocoris*)  
(Stett. Ent. Ztg. 92, 8–9)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Brasilien, Pará Sieber, Nr. 1914, im Museum Berlin; 1 ♀ Paratypus, ohne Vaterlandsangabe, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, ohne Fundortangabe.

***formosanus*** BERGROTH, 1914 (*Scantius*)  
(Ent. Mitt. 3, 356)

Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***glebula*** BREDDIN, 1909 (*Indra*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 299)

♂ Holotypus, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, im DEI.

***immundulus*** BREDDIN, 1901 (*Antilochus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 20, 83–84)

♂ Holotypus, Insel Dammer, im DEI.

*limbaticollis* BREDDIN, 1901 (*Dindymus*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 8, 115)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, Celebes; 1 Paralectotypus, Celebes, Loka und Umgebung, 1000–1300 m, X. 1895, leg. SARASIN, hiermit festgelegt.

*luteolus* BREDDIN, 1909 (*Dysdercus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 300–301)

Syntypen, Ceylon, Anuradhapura; Nalanda; Kandy; Bandarawella, leg. HORN.

DEI: Lectotypus, Ceylon, Kandy, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Bandarawella, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, hiermit festgelegt.

*maximus* BREDDIN, 1900 (*Antilochus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 172–173)

Syntypen, Sumatra, Murdian; Palawan, Mindanao.

DEI: Lectotypus, N. O. Sumatra, Murdian, IV. 1884, leg. TRESCHER, hiermit festgelegt.

*megalopygus* BREDDIN, 1909 (*Dysdercus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 300–301, Fußnote, Fig. 25)

Syntypen, Sunda Inseln, Borneo.

DEI: Lectotypus, Borneo, hiermit festgelegt.

*micropygus* BREDDIN, 1909 (*Dysdercus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 299–300, Fig. 24)

Zahlreiche Syntypen, Ceylon, Anuradhapura; Nalanda; Paradna; Dambulla; Weligama; leg. HORN.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Weligama, leg. HORN; 3 Paralectotypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN; 3 Paralectotypen, Ceylon, Paradna, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, Dambulla, leg. HORN, hiermit festgelegt.

*nervosus* BREDDIN, 1901 (*Ectatops*)  
(Soc. ent. 16, 11)

Syntypen, Borneo, Banguay.

DEI: Lectotypus, Banguay bei Borneo, hiermit festgelegt.

*nigerrimum* BREDDIN, 1898 (*Astemma*)  
(Jahrb. Nat. Ver. Magdeb. 1896–97, (1898), 153–155)

♀ Holotypus, Bolivia, im DEI.

*parviceps* BREDDIN, 1901 (*Euscopus*)  
(Soc. ent. 16, 26)

Syntypen, Sumatra.

DEI: 3 Syntypen, Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS.

*schmidtii* SCHMIDT, 1931 (*Lecadra*)  
(Stett. Ent. Ztg. 92, 49–50)

♀ Holotypus, Brasilien, Santarem, XII. 1921, leg. BODEMEYER, im DEI.

*speculum* BREDDIN, 1901 (*Ectatops*)  
(Soc. ent. 16, 11)

Syntypen, Sumatra.

DEI: Lectotypus, Soekaranda, I. 1894, leg. DOHRN.

**surinamensis** SCHMIDT, 1931 (*Acinocoris*)  
(Stett. Ent. Ztg. 92, 10–11)

♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, Surinam, Endrulat, im Mus. Stettin; 1 ♀ Paratypus, Demerara, Nr. 1916, im Mus. Berlin; 1 ♀ Paratypus, Surinam, im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, Surinam.

**villosa** BREDDIN, 1901 (*Physopelta*)  
(Soc. ent. 16, 11)

Syntypen, Sumatra.

DEI: 2 Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS.

**vaga** SCHMIDT, 1931 (*Theraneis*)  
(Stett. Ent. Ztg. 92, 42–43)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Brasilien, Bahia, ex. coll. FRUHSTORFER, im Mus. Stettin; 1 ♂ Paratypus, Brasilien, Bahia, leg. FRUHSTORFER, im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, Bahia, Brasilia, leg. FRUHSTORFER.

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

**borneensis** BREDDIN (*Dindymus*)

DEI: 1 Ex. Banguéy, als Typus ausgezeichnet.

**decolor** BREDDIN (*Dysdercus*)

DEI: 1 Ex. Insel Damma, als Typus ausgezeichnet.

**varians** BREDDIN (*Physopelta*)

DEI: 2 Ex. Soekaranda, I. 1894, leg. DOHRN.

## Piesmidae

**suaedae** WAGNER, 1953 (*Piesma*)  
(Nachr. Mus. Aschaffenh. 41, 67–74)  
(Ent. Nachrichtenbl. 6, 5–7, Fig. 1, 2; 1954)

♀ Holotypus, 37 ♂♂, 42 ♀♀, Paratypen, Dalmatien, Split bei K. Lukačič, 2. VIII. 1943, leg. NOVAK.

DEI: 2 Paratypen, Dalmatien, K. Lukačič, 2. VIII. 1943, leg. NOVAK.

## Tingidae

**attia** DRAKE & COBBEN, 1960 (*Dichtyla*)  
(Stud. Faun. Curacao and Caribbean Isl. 11, Nr. 54, 69–73, Fig. 74a, 75a, 76a, 77)

♂ Holotypus, Curaçao, St. Martha, 13. X. 1957; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, St. Martha, Curacao, 13. X. 1956.

**baccharidis** DRAKE & HAMBLETON, 1938 (*Leptobyrsa*)  
(Rev. Ent. Brasil 8, 65–66)

♂ Holotypus, 45 Paratypen, São Paulo, Capital, 3. VIII. 1934; 1 Paratypus, Bahia; 1 Paratypus, Rio de Janeiro.

DEI: 1 Paratypus, São Paulo, Brazil, 3. VIII. 1934, leg. HAMBLETON.

**bombacis** DRAKE & POOR, 1938 (*Tigava*)  
(Bull. Brooklyn Ent. Soc. 33, 32–33)

♂ Holotypus, 8 Paratypen, Vicosa, Brazil; 1 Paratypus, Rio de Janeiro, Brazil, in Sammlung DRAKE.

DEI: 2 Paratypen, Vicosa, Brazil, Minas Geraes, 6. V. 1934, leg. HAMBLETON.

**bruchi** DRAKE, 1928 (*Leptobyrsa*)  
(Physis 9, 73–74)

♂ Holotypus, Paratypen, Córdoba, Argentina, South America, leg. BRUCH, in den Sammlungen BRUCH, PENNINGTON, DRAKE und im Iowa State College.  
DEI: 2 Paratypen, Cordoba, 12. XII. 1921.

**formosa** DRAKE, 1923 (*Monanthia*)  
(Ohio Journ. Sci. 23, 102–103)

♂ Holotypus, 14 Paratypen, Kankau (Koshun), Formosa, 1912, leg. SAUTER, im DEI, im U. S. N. M. und in Sammlung DRAKE.  
DEI: Holotypus, 8 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**gracilicornis** WAGNER, 1940 (*Serenthia*)  
(Verh. Ver. naturw. Heimatf. Hamburg 28, 11–12)

Holotypus, 130 Paratypen; Frankfurt a. O., leg. SCHUKATSCHEK; Hamburg, leg. KOLTZE; Frankfurt a. M., leg. GULDE; Karlstadt, Kroatien, leg. HAENSCH; in Sammlung WAGNER.  
DEI: 2 Paratypen, Frankfurt a. O., leg. SCHUKATSCHEK.

**horni** DRAKE, 1923 (*Xenotingis*)  
(Ohio Journ. Sci. 23, 105–106, Fig. 1)

♀ Holotypus, Kosempo, Formosa, VIII. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

**involutus** DRAKE, 1925 (*Galeatus*)  
(Ent. Mitt. 14, 108–109)

♀ Holotypus, 4 Paratypen, Sainte Marie de Madagascar, coll. NOUALHIER, 1898, im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**laidis** DRAKE & HAMBLETON (*Leptodictya*)  
(Journ. Wash. Acad. Sci. 35, 362–363)

♂ Holotypus, 41 Paratypen, Villavicencio, Colombia, 3. XI. 1944, in Sammlung DRAKE.  
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**machalana** DRAKE, 1948 (*Amblystira*)  
(Bol. Ent. Venezolana 7, 22)

♂ Holotypus, viele Paratypen, Machala, Ecuador, 27. X. 1944, leg. HAMBLETON; viele Paratypen, Machala, Vinces, 14. X. 1944; Pichilingue, Ecuador, 1944; in Sammlung DRAKE.  
DEI: 2 Paratypen, Vinces, Ecuador, 14. X. 1944, leg. HAMBLETON.

**magnifica** HACKER, 1929 (*Leptobyrsa*)  
(Mem. Queensl. Mus. 9, 331–332, Taf. 35 Fig. 13)

Holotypus, Mt. Tambourine, Q., I., leg. HACKER; Paratypen, Mt. Tambourine, XI, I.; Brookfield, XI./III.; Nanango District, XI., leg. HACKER, im Queensl. Mus.  
DEI: 3 Paratypen, Tambourine, 14. I. 1927, leg. HACKER.

**parana** DRAKE & HAMBLETON, 1944 (*Plesiobyrsa*)  
(Proc. Ent. Soc. Wash. 46, 95)

♂ Holotypus, 46 Paratypen, Belem, Para, Brazil, 3. X. 1938, leg. HAMBLETON & SAUER; Holotypus in Sammlung DRAKE.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**paspalii** DRAKE & HAMBLETON, 1934 (*Leptodictya*)  
(Rev. Ent. 4, 443–444)

♂ Holotypus, 21 Paratypen, Viçosa, Minas Geraes, Brazil, 22. VI. 1933, in Sammlung DRAKE.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**prunellae** DRAKE & HAMBLETON, 1946 (*Teleonemia*)  
(Ent. News 57, 121–122)

♂ Holotypus, 17 Paratypen, Guatemala City, Guatemala, 15. V. 1945, in Sammlung DRAKE.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**reyi** WAGNER, 1954 (*Copium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1, 205–206)

♂ Holotypus, 8 ♂♂, 8 ♀♀, Paratypen, Südfrankreich, Pyrenées orientales, Medeloc bei Banyuls, 600 m, 29. V. 1951; 1 ♀, vom selben Fundort, 5. VI. 1953; 3 ♂♂, 4 ♀♀, vom selben Fundort, 19. VI. 1954; 19 ♂♂, 16 ♀♀, Albi, Tarn, Côte de Jasens, 14.–16. VI. 1954, leg. WEBER & WAGNER, in Sammlung WAGNER.  
DEI: 2 Paratypen, Albi (Tarn), Cote de Jussens, Südfrankreich, 14.–16. VI. 1954, leg. WAGNER.

**sauteri** DRAKE, 1923 (*Monanthia*)  
(Ohio Journ. Sci. 23, 103)

♀ Holotypus, Kankau (Koshun), Formosa, V. 1912, leg. SAUTER, im DEI; 1 Paratypus, Tainan, Formosa, 1912, leg. SAUTER, in Sammlung DRAKE.  
DEI: Holotypus, Kankau (Koshun), Formosa, V. 1912, leg. SAUTER.

## Reduviidae

**abortivus** BREDDIN, 1901 (*Pirates*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 102–103)

♀ Holotypus, S. Celebes, Loka und Umgebung, 1000–1300 m, X. 1895, leg. SARASIN, im DEI.

**aequatoria** BREDDIN, 1901 (*Corcia*)  
(Soc. ent. 16, 59–60)

♂♀ Syntypen, Ecuador.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**affinis** MILLER, 1945 (*Neothodelmus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 413–415, Fig. 3)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Sumatra, leg. FÖRSTER, im DEI.  
DEI: Holotypus, Sumatra, leg. FÖRSTER.

**amoena** MILLER, 1956 (*Anapothea*)  
(Beitr. Ent. 6, 8–9, Fig. 9)

♂ Holotypus, Brazil, Rio Grande do Sul, im DEI.

**anak** MILLER, 1948 (*Korinchocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 438, Fig. 29)

♀ Holotypus, O. Java, Pengalengan, 4000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**angusticeps** MILLER, 1948 (*Ectomocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 438–439, Fig. 30)

♀ Holotypus, Batavia, im DEI.

**apicalis** BREDDIN, 1903 (*Tiarodurganda*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 112)

♂ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**apicata** MCATEE & MALLOCH, 1926 (*Ploiaria*)  
(Philipp. Journ. Sci. 30, 143)

♂ Holotypus, 16 Paratypen, Borneo, Sandakan, leg. BAKER.  
DEI: 1 Paratypus, Sandakan, Borneo, leg. BAKER.

**armiventris** BREDDIN, 1903 (*Nalata*)  
(Soc. ent. 18, 108)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**asper** MILLER, 1956 (*Oncocephalus*)  
(Beitr. Ent. 6, 1–2, Fig. 1)

♀ Holotypus, S. O. Borneo, im DEI.

**audax** BREDDIN, 1901 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 16, 83–84)

♀ Holotypus, Ecuador, Napo, leg. HAENSCH, im DEI.

**aurantiacus** BREDDIN, 1903 (*Pristhesancus*)  
(Soc. ent. 18, 76)

♀ Holotypus, Holländ. Neu Guinea, Hattan, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**avarus** MILLER, 1948 (*Acanthaspis*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 433–434, Fig. 25)

♀ Holotypus, Sanao, Mindanao, im DEI.

**bellicosa** BREDDIN, 1901 (*Scipinia*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 89–100)

Holotypus, C. Celebes, Mapane und Umgebung, II. 1895, leg. SARASIN, im DEI.

**bellula** MILLER, 1948 (*Eulges*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 462–464, Fig. 66)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Celebes, Ussu und Umgebung; Posso See.  
DEI: Holotypus, Celebes, Ussu und Umgebung.

**bellulus** MILLER, 1948 (*Acanthaspis*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 432–433, Fig. 23)

♂ Holotypus, Zamboanga, Mindanao, im DEI.

**bellulus** MILLER, 1948 (*Rhinocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 456, Fig. 57)

♀ Holotypus, Zamboanga, Mindanao, im DEI.

**bicolor** MILLER, 1956 (*Santainezia*)  
(Beitr. Ent. 6, 5–6, Fig. 5)

♂ Holotypus, Ecuador, Santa Inéz, im British Museum; 1 ♂ Paratypus, vom selben Fundort, leg. HAENSCH, im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH.

**bicoloripes** BREDDIN, 1901 (*Pirates*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 115)

Holotypus, Celebes, Samanga, XI. 1895, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**bimaculata** BREDDIN, 1914 (*Rhiginia*)  
(Abh. Senckenbg. Nat. Ges. 36, 59)

♂ Holotypus, Ecuador, Palmas, leg. HAENSCH, im DEI.



**blanda** BREDDIN, 1903 (*Tetrozia*)  
(Soc. ent. 18, 82–83)

♂ Holotypus, Fernando Po, im DEI.

**blandula** MILLER, 1948 (*Lisarda*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 429, Fig. 19)

♀ Holotypus, Sumatra, im DEI.

**boliviana** BREDDIN, 1903 (*Cricetopareis*)  
(Soc. ent. 18, 66)

♂♀ Syntypen, Bolivien.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Bolivien, hiermit festgelegt.

**bramarbas** BREDDIN, 1903 (*Trantha*)  
(Soc. ent. 18, 4)

Holotypus, Nordost Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, im DEI.

**breddini** MILLER, 1948 (*Blasticus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 459, Fig. 61)

♀ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, Süd Java.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Süd Java.

**breddini** MILLER, 1948 (*Ectrychotes*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 450, Fig. 47)

♀ Holotypus, S. O. Borneo, im DEI.

**breddini** MILLER, 1956 (*Onccephalus*)  
(Beitr. Ent. 6, 2–3, Fig. 2)

♀ Holotypus, Borneo, im DEI.

**brevicornis** BREDDIN, 1900 (*Sastrapada*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 174–175)

Syntypen, Borneo, Mons Kina Balu.

DEI: Lectotypus, Borneo, Kina Balu, hiermit festgelegt.

**brevifurcatus** BREDDIN, 1899 (*Sycanus*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 181)

♀♀ Syntypen, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, V. 1896, leg. FRUHSTORFER.

DEI: ♀ Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**brevispinus** BREDDIN, 1900 (*Isyndus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 180–181)

Syntypen, Java; Celebes meridionalis; Key Tual.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Celebes, Bua-Kraeng, 5000 Fuß, II. 1896, leg. FRUHSTORFER; 3 Paralectotypen, Java, hiermit festgelegt.

**brunneiceps** BREDDIN, 1912 (*Ischnobaena*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 406)

♂♂ Syntypen, Ceylon, Kanthaley, leg. HORN, im DEI.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Ceylon, Kanthaley, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**callida** MILLER, 1948 (*Hagia*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 464, Fig. 67)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Zamboanga, Mindanao, im DEI.

DEI: Holotypus, Mindanao, Zamboanga.

**callida** MILLER, 1948 (*Lisarda*)(Trans. Ent. Soc. London **99**, 428–429)

♀ Holotypus, Tebing Tinggi, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS, im DEI.

**callidus** MILLER, 1948 (*Acanthaspis*)(Trans. Ent. Soc. London **99**, 433, Fig. 24)

♀ Holotypus, Zamboanga, Mindanao, im DEI.

**callidus** MILLER, 1948 (*Ectrychotes*)(Trans. Ent. Soc. London **99**, 448, Fig. 46)

♂ Holotypus, Sanao, Mindanao, leg. SCHULTZE, im DEI.

**carbonarius** BREDDIN, 1903 (*Endochus*)(Soc. ent. **17**, 170)

♂ Holotypus, Assam, Khasi Hills, im DEI.

**carnifex** BREDDIN, 1903 (*Daraxa*)(Soc. ent. **18**, 100)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, im DEI.

**cave** BREDDIN, 1903 (*Caprocethera*)(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. **1903**, 116)

♂ Holotypus, Ostafrika, Tana, im DEI.

**celator** MILLER, 1948 (*Oncocephalus*)(Trans. Ent. Soc. London **99**, 423, Fig. 13)♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen, Montalban, Luzon, leg. SCHULTZE.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.**celebensis** MILLER, 1956 (*Neocentrocnemis*)(Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent. **4**, 265, Textfig. 23)

♀ Holotypus, Celebes, im DEI.

**celebensis** MILLER, 1948 (*Thodelmus*)(Trans. Ent. Soc. London **99**, 423–424, Fig. 14)

♀ Holotypus, N. Celebes, im DEI.

**celer** MILLER, 1948 (*Polytoxus*)(Trans. Ent. Soc. London **99**, 413, Fig. 2)♀ Holotypus, 3 ♀♀ Paratypen, Tengger Gebirge, Ost Java, leg. FRUHSTORFER, im DEI.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.**chlorogaster** MILLER, 1948 (*Rhinocoris*)(Trans. Ent. Soc. London **99**, 456, Fig. 56)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Zamboanga, Mindanao, im DEI.

**cimboides** BREDDIN, 1898 (*Pothea*)(Jahrb. Nat. Ver. Magdeb. **1898–97** (1898), 157–158)3 ♀♀ Syntypen, Bolivia.  
DEI: Lectotypus, Bolivien, hiermit festgelegt.**clavata** MILLER, 1948 (*Sirthenaea*)(Trans. Ent. Soc. London **99**, 444–446, Fig. 40)

♂ Holotypus, Sumatra, leg. CARTHAUS, im DEI.

**clepta** MILLER, 1948 (*Sastrapada*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 415, Fig. 4)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Tandjong Moerawa, Sumatra; 1 ♂ Paratypus, Sumatra, leg. FÖRSTER, im DEI.

**consobrinus** MILLER, 1948 (*Pirates*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 441, Fig. 34)

♂ Holotypus, Java. im DEI.

**conspersa** BREDDIN, 1901 (*Rhiginia*)  
(Soc. ent. 16, 75)

Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

**corallinus** MILLER, 1948 (*Vilius*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 453, Fig. 52)

♀ Holotypus, Süd Java, im DEI.

**cyaneoniger** BREDDIN, 1903 (*Aulacoclopius*)  
(Soc. ent. 18, 4-5)

Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2-3000 Fuß, IV.-V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**daedalion** MILLER, 1948 (*Sycanus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 461, Fig. 63)

♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Mingkako, Kendari, SO. Celebes, II.-III. 1903, leg. SARASIN.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**despotiator** MILLER, 1948 (*Acanthaspis*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 432, Fig. 22)

♂ Holotypus, Mindanao, Sanao, Higau, leg. SCHULTZE, im DEI.

**disparilis** MILLER, 1948 (*Oncocephalus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 422, Fig. 11)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Luzon, leg. SCHULTZE, im DEI.

DEI: Holotypus, Luzon, leg. SCHULTZE.

**domitus** MILLER, 1948 (*Euagoras*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 466, Fig. 69)

♀ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**dubia** MILLER, 1948 (*Durganda*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 434-436, Fig. 26)

♂ Holotypus, Philippinen?, im DEI.

**dubia** VILLIERS, 1943 (*Tribelocephala*)  
(Rev. Franç Ent. 10, 20, Fig. 36)

♀ Holotypus, Guinée portugaise, Rio Cassine, IV., im Museum Paris; 1 Paratypus, Cameroun.

DEI: 1 Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT.

**dubius** MILLER, 1956 (*Oncocephalus*)  
(Beitr. Ent. 6, 4, Fig. 4)

♀ Holotypus, Borneo, Kina Balu, im DEI.

**elegans** MILLER, 1948 (*Euagoras*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 466, Fig. 68)

♀ Holotypus, S. O. Borneo, im DEI.

*elegans* BREDDIN, 1903 (*Platymiris*)  
(Soc. ent. 13, 99–100)

♂ Holotypus, Fernando Po, Sa. Isabel, im DEI.

*entomophaga* MILLER, 1948 (*Sastrapada*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 415–416, Fig. 5)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Montalban, Luzon, leg. SCHULTZE.  
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*erebus* MILLER, 1948 (*Sycanus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 461–462, Fig. 64)

♀ Holotypus, Sumatra, leg. FÖRSTER, im DEI.

*excelsus* MILLER, 1948 (*Pirates*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 442, Fig. 35)

♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen Sumatra.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Sumatra.

*eximius* MILLER, 1948 (*Thodelmus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 424–426, Fig. 15)

♂ Holotypus, Tebing Tinggi, NO. Sumatra, leg. SCHULTHEISS, im DEI.

*fasciata* MILLER, 1948 (*Apechiella*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 430, Fig. 20)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Tebing Tinggi, NO. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.  
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*fasciiventris* BREDDIN, 1903 (*Cutocoris*)  
(Soc. ent. 17, 170)

♂♀ Syntypen, Tonkin, Central China.

DEI: Lectotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*fimbriatus* MILLER, 1948 (*Rhinocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 453–455, Fig. 53)

♂ Holotypus, Süd Java, im DEI.

*fruhstorferi* BREDDIN, 1899 (*Tiarodes*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 180)

Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, VI. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*fugax* BREDDIN, 1903 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 13, 114)

♂ Holotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, im DEI.

*furtivus* MILLER, 1948 (*Ischnonyctes*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 412–413, Fig. 1)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Tengger Gebirge, Ost Java, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, sehr schlecht erhalten, nur noch Abdomen und Halsschild vorhanden.

*geniculatus* BREDDIN, 1899 (*Euagoras*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 182–183)

♀ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**germana** BREDDIN, 1909 (*Irantha*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 305–306)

♂ ♀ Syntypen, Ceylon, Anuradhapura; Nalanda, leg. HORN.  
DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN; 3 Paralectotypen, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN; 1 Paralectotypus, Ceylon, leg. HORN, hiermit festgelegt.

**gypps** MILLER, 1948 (*Oncocephalus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 418–419, Fig. 8)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Sumatra.  
DEI: Holotypus, Sumatra.

**guasayana** WYGODZINSKY & ABALOS, 1949 (*Triatoma*)  
(Semana méd. Suppl., B 56, 2)

Holotypus, zahlreiche Paratypen, Colonia Dora, Santiago del Estero, IX. 1948, leg. GÓMEZ, im Inst. Med. Reg. Nros Nr. 714–716; zahlreiche Paratypen, von verschiedenen Fundorten aus Argentinien und Bolivien.  
DEI: 2 Paratypen, Colonia Dora, Sgo. del Estero, ARG, 17. IX. 1948.

**guineensis** VILLIERS, 1943 (*Tribelocephala*)  
(Rev. Franç. Ent. 10, 17, Fig. 35)

♂ Holotypus, ♂♂ Paratypen, Guinée française, Mamou, 1910, leg. GRUVEL, im Mus. Paris.  
DEI: 1 Paratypus, Guinée Franç., Mamou, leg. GRUVEL, 1910.

**haematogaster** BREDDIN, 1903 (*Pothea*)  
(Soc. ent. 18, 108)

♂ Holotypus, Bolivia, Amazonas, im DEI.

**hilaris** MILLER, 1948 (*Rhinocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 459, Fig. 60)

♀ Holotypus, Zamboanga, Mindanao, im DEI.

**histris** MILLER, 1948 (*Schottus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 452–453, Fig. 51)

♂ Holotypus, Sumatra, leg. CARTHAUS, im DEI.

**horni** MILLER, 1948 (*Sycanus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 462, Fig. 65)

♀ Holotypus, Java, im DEI.

**immodesta** BERGROTH, 1914 (*Acanthaspis*)  
(Ent. Mitt. 3, 363–364)

♂♂ Syntypen, Kosempo.  
DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Kosempo, Formosa, VII. 1909, leg. SAUTER, hiermit festgelegt.

**immundus** BREDDIN, 1903 (*Opisthoplatys*)  
(Soc. ent. 17, 178)

♀ Holotypus, Nordost Sumatra, Murdian, IV. 1884, leg. TRESCHER, im DEI.

**impavidus** MILLER, 1948 (*Oncocephalus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 418, Fig. 7)

♂ Holotypus, Sumatra, im DEI.

**impexus** MILLER, 1948 (*Oncocephalus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 419, Fig. 9)

♀ Holotypus, Sumatra, im DEI.

*incontaminata* BERGROTH, 1914 (*Velitra*)  
(Ent. Mitt. 3, 362–363)

♂ Holotypus, Formosa, Kosempo, VII. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

*insulanus* MILLER, 1948 (*Siamocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 472, Fig. 76)

♂ Holotypus, Celebes, M. Or., im DEI.

*javana* MILLER, 1948 (*Caecina*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 447–448, Fig. 44)

♂ Holotypus, Süd Java, im DEI.

*javana* MILLER, 1948 (*Pasiropsis*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 430–432, Fig. 21)

♀ Holotypus, Java, leg. FÖRSTER, im DEI.

*jeanneli* VILLIERS, 1943 (*Tribelocephala*)  
(Rev. Franç. Ent. 10, 16–17, Fig. 38)

♂ Holotypus, Ostafrika, südöstliche untere Zone des Kilimandjaro, Neu Moschi, 800 m; Paratypen, Lindi, im DEI; Campi Limba, Zuwani, VI., im Mus. Congo belge; Katanga, Kapiri, XII.; Kakyelo, XI.; Elisabethville, XI.; Luashi, XII.  
DEI: 1 Paratypus, Lindi, D. Ostafrika.

*kelantanensis* MILLER, 1948 (*Ectrychotes*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 450, Fig. 48)

♂ Holotypus, Kelantan, Malaya, im DEI.

*laeta* BREDDIN, 1913 (*Haematoloecha*)  
(Arch. Nat. gesch. 78 A (1912), Heft 11, 106)

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.

DEI: Lectotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*lanius* MILLER, 1948 (*Sycanus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 459–461, Fig. 62)

♀ Holotypus, Toli Toli, N. Celebes, XI.–XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*limbata* BREDDIN, 1901 (*Zirta*)  
(Soc. ent. 18, 60)

♀ Holotypus, Bolivien, im DEI.

*limbativentris* BREDDIN, 1913 (*Sphedanolestes*)  
(Arch. Nat. gesch. 78 A (1912), Heft 11, 105–106)

♀ Holotypus, Kaschmir, leg. ROST, im DEI.

*longiceps* MILLER, 1956 (*Haematoloecha*)  
(Beitr. Ent. 6, 6, Fig. 6)

♀ Holotypus, Japan, Tsushima, IX.–X., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*maculipennis* BREDDIN, 1903 (*Cethera*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 116)

♂♂ Syntypen, Nord Kamerun.

DEI: Lectotypus, N. Kamerun Johann Albrechtshöhe, hiermit festgelegt.

*maculiventris* BREDDIN, 1903 (*Pristhesancus*)  
(Soc. ent. 18, 12)

♂♀ Syntypen, Murray Inseln.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Murray Inseln, hiermit festgelegt.

**malaisei** ELKINS, 1954 (*Atrachelus*)

(Proc. ent. Soc. Wash. 56, 114–115)

♂ Holotypus, 6 Paratypen, Cuatro Ojos, Bolivia, IX. 1917, in Sammlung LIZER Y TRELLES Argentina; 1 Paratypus, Peru Puerto Bermudez, Rio Piehis, 12.–19. VI. 1920; 1 Paratypus, Brazil, Pambu, Bahia, leg. SCHUBART; 1 Paratypus, Argentina, San Ramon, Dep. Famaille, Tucuman, V. 1942, leg. GARCIA; 1 Paratypus, Argentina, Santa Fé, 30. IX., leg. BRIDAROLLIS.

DEI: 1 Paratypus, Cuatro Ojos, Bolivia, IX. 1917.

**manicatus** MILLER, 1948 (*Endochus*)

(Trans. Ent. Soc. London 99, 467, Fig. 70)

♂ Holotypus, Süd Java, im DEI.

**mariae** WYGODZINSKY, 1953 (*Ghilianella*)

(Acta Zool. Lilloana 14, 292–295, Fig. 10–25)

♂ Holotypus, Peru, Berg bei Pachacamac, 350 m, 15. II. 1952, 35 km südlich von Lima, leg. MONRÓS & WEYRAUCH, im Inst. MIGUEL LILLO; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Berg bei Pachacamac, 350 m, 35 km südlich Lima, 15. II. 1952, leg. MONRÓS & WEYRAUCH.

**migrans** BREDDIN, 1903 (*Triatoma*)

(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 111)

♂♀ Syntypen, Süd Java; Nordost Sumatra.

DEI: Lectotypus, N. O. Sumatra, Tebing tinggi, 30. III. 1884, leg. SCHULTHEISS; 1 Paralectotypus, Süd Java, hiermit festgelegt.

**mitvus** MILLER, 1948 (*Rhinocoris*)

(Trans. Ent. Soc. London 99, 455, Fig. 54)

♂ Holotypus, Patunuang, S. Celebes, I. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**mimulus** MILLER, 1948 (*Pirates*)

(Trans. Ent. Soc. London 99, 442–444, Fig. 37)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, S. O. Borneo.

DEI: Holotypus, SO. Borneo.

**minas** BREDDIN, 1900 (*Panthous*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 182)

6 ♂♂, ♀♀ Syntypen, Palawan merid.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Süd Palawan, hiermit festgelegt.

**miniacea** BREDDIN, 1901 (*Veledella*)

(Allg. Ztschr. Ent. 6, 115)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, Celebes, Posso See und Umgebung, II. 1895; 1 Paralectotypus, Celebes, hiermit festgelegt.

**modestus** BREDDIN, 1903 (*Pristhesancus*)

(Soc. ent. 18, 76)

♂ Holotypus, Deutsch Neu Guinea, leg. SPEYER, im DEI.

**moerens** BREDDIN, 1898 (*Racelda*)

(Jahrb. Nat. Ver. Magdeb. 1896–97 (1898), 158–159)

♂ Holotypus, Espirito Santo, Brasilien, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**moesta** MILLER, 1948 (*Parasclomina*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 472–473, Fig. 77)

♂ Holotypus, Tengger Gebirge, Ost Java, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: Holotypus, Java.

**monoceros** BREDDIN, 1903 (*Vilius*)  
(Zool. Anz. 26, 508)

♂♀ Syntypen, Java.  
DEI: 2 Syntypen, Key Tual, leg. ROHDE.

**montalbanus** MILLER, 1948 (*Onccephalus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 420, Fig. 10)

♀ Holotypus, Montalban, Luzon, leg. SCHULTZE.

**monticola** BREDDIN, 1903 (*Diplosiacanthia*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 122)

♂♂ Syntypen, Nord Kamerun, Johann Albrechtshöhe.  
DEI: Lectotypus, N. Camerun, Joh. Albrechtshöhe; 1 Paralectotypus, Kamerun, hiermit festgelegt.

**mordax** BREDDIN, 1903 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 18, 114)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, im DEI.

**morio** BREDDIN, 1903 (*Mirambulus*)  
(Soc. ent. 18, 108)

♀ Holotypus, Bolivia.  
DEI: 1 Typus ?, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m.

**morio** BREDDIN, 1903 (*Pasiropsis*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 117)

♂ Holotypus, Sumatra, leg. FÖRSTER, im DEI.

**morosa** BREDDIN, 1903 (*Haematoloccha*)  
(Zool. Anz. 26, 511)

♀♀ Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: Lectotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**morosus** MILLER, 1948 (*Thodelmus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 426–428, Fig. 17)

♂ Holotypus, SO. Borneo, im DEI.

**musculus** MILLER, 1948 (*Pirates*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 442, Fig. 36)

♀ Holotypus, Java, im DEI.

**nana** MILLER, 1956 (*Glymmatophora*)  
(Beitr. Ent. 6, 7, Fig. 7)

♀ Holotypus, 4 ♀♀ Paratypen, Abyssinia, Harrar, leg. KRISTENSEN, im DEI; 1 ♀ Paratypus, vom selben Fundort, V. 1911, leg. TURNER, im British Museum.  
DEI: Holotypus, 4 Paratypen, Harrar, leg. KRISTENSEN.

**nanus** BREDDIN, 1903 (*Opistoplatys*)  
(Soc. ent. 17, 178)

♂♂ Syntypen, Nordost Sumatra, Tebing Tinggi; Malakka, Perak.  
DEI: Lectotypus, NO. Sumatra, Tebing Tinggi, 25. IV. 1884, leg. SCHULTHEISS; 1 Paralectotypus, Malacca, Perak, hiermit festgelegt.



**neglecta** MILLER, 1956 (*Centrocnemis*)  
(Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent. 4, 243–245, Textfig. 13)

♀ Holotypus, Borneo, Kina Balu, im DEI.

**niger** BREDDIN, 1901 (*Mirambulus*)  
(Soc. ent. 16, 75)

Syntypen, Ecuador.

DEI: Lectotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**nigricollis** BREDDIN, 1903 (*Tetrozia*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 118–119)

♂ Holotypus, Ostindien, Sangli, im DEI.

**nigripes** BREDDIN, 1903 (*Opistoplatus*)  
(Soc. ent. 17, 177–178)

♂ Holotypus, West Java, Sukabumi, 2000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**nigriventris** VILLIERS, 1943 (*Diaspidius*)  
(Bull. Soc. ent. Fr. 48, 27–28, Fig. 2)

♀ Holotypus, Fernando Po, 1901, leg. CONRADT, im Mus. Paris; 1 Paratypus, Fernando Po, leg. EIDMANN, 1939–40, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Fernando Po, Spanisch Guinea, 1939–40.

**nigrolutea** BREDDIN, 1903 (*Cleptriola*)  
(Soc. ent. 18, 108)

♂ Holotypus, Fernando Po, S. Isabel, im DEI.

**nitida** MILLER, 1948 (*Neoscadra*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 446–447, Fig. 42)

♀ Holotypus, Tebing Tinggi, NO. Sumatra, leg. SCHULTHEISS, im DEI.

**nitida** MC ATEE & MALLOCH, 1926 (*Ploiuria*)  
(Philipp. Journ. Sci. 30, 145)

♂ Holotypus, 18 Paratypen, Surigao, Mindanao; Paratypen, Butuan; Davao, Iligan, Mindanao; Basilan, leg. BAKER.

DEI: 1 Paratypus, Surigao, Mindanao, leg. BAKER.

**nitidus** MILLER, 1948 (*Tiarodes*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 436–438, Fig. 28)

♀ Holotypus, Barabei, Z. O. Afd. Borneo, 1883, leg. POOL, im DEI.

**nobilis** MILLER, 1948 (*Rhinocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 458, Fig. 58)

♀ Holotypus, Montalban, Luzon, leg. SCHULTZE, im DEI.

**nocuus** MILLER, 1948 (*Endochus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 467, Fig. 71)

♀ Holotypus, Celebes, M. Or., im DEI.

**nugax** BREDDIN, 1903 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 18, 108)

♀♀ Syntypen, Ecuador, leg. HAENSCH.

DEI: Lectotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

**othello** BREDDIN, 1903 (*Agyrius*)  
(Soc. ent. 17, 170–171)

♀ Holotypus, Südost Borneo, im DEI.

**obliquispinus** BREDDIN, 1900 (*Isyndus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 181–182)

Syntypen, Java or., Montes Tengger; Java occ., Pengalengan, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ost Java, Tengger Gebirge, leg. FRUHSTORFER; 1 Paralectotypus, Java occ. Pengalengan, 4000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**obtusifuscatus** BREDDIN, 1903 (*Sycanus*)  
(Soc. ent. 17, 170)

♂♀ Syntypen, Insel Sumba.  
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Insel Sumbawa, hiermit festgelegt.

**ornata** MILLER, 1948 (*Neoscaëdra*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 447, Fig. 43)

♀ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Sanao, Mindanao; 1 ♀ Paratypus, Zamboanga, Mindanao, leg. SCHULTZE.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Sanao, Mindanao, leg. SCHULTZE.

**ornatum** BREDDIN, 1900 (*Archilestidium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 176–177)

Syntypen, N. S. Wales.  
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, N. S. Wales, hiermit festgelegt.

**ornata** MILLER, 1949 (*Sciaphilocoris*)  
(Proc. Ent. Soc. London, B 18, 233)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Malaya, Boh. Plantations, Cameron Highlands, 3500 Fuß, 4. XI. 1941; 1 ♂, 2 ♀♀, vom selben Fundort, 18. VIII. 1941, leg. MILLER.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 4. XI. 1941.

**paganus** MILLER, 1956 (*Oncoccephalus*)  
(Beitr. Ent. 6, 3–4, Fig. 3)

♀ Holotypus, SO. Borneo, im DEI.

**palawanica** MILLER, 1956 (*Neocentrocnemis*)  
(Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent. 4, 260–262, Textfig. 22)

♂ Holotypus, 3 ♂♂, 1 ♀ Paratypen, Philippine Is., Binaluan, N. Palawan, XI.–XII. 1913, leg. BOETTCHE, im British Mus. und im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**pallens** BREDDIN, 1900 (*Sycanus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 178–179)

Syntypen, Insel Balabac bei Borneo.  
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Balabac bei Borneo, hiermit festgelegt.

**patricius** MILLER, 1948 (*Pirates*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 444, Fig. 39)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Sumatra, im DEI.  
DEI: Holotypus, Sumatra.

**pauper** BREDDIN, 1908 (*Edocla*)  
(Wien. Ent. Ztg. 27, 79)

♂ Holotypus, Südost Afrika, Delagoa Bai, 13. X. 1882, leg. MONTEIRO, im DEI.

**perelegans** BREDDIN, 1903 (*Agriosphodrus*)  
(Soc. ent. 17, 170)

♂ Holotypus, Tonkin, Than Moi, VI.–VII., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

*perelegans* BREDDIN, 1901 (*Mendis*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 115)

Syntypen, Celebes.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Celebes, Vulc. Soputan, Pottal?, 1200 m, IV. 1895, hiermit festgelegt.

*pertinax* BREDDIN, 1903 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 18, 114)

♀♀ Syntypen, Bolivia.

DEI: Lectotypus, Bolivien, Coroico, hiermit festgelegt.

*petax* BREDDIN, 1901 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 16, 75)

Syntypen, Ecuador.

DEI: Lectotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, hiermit festgelegt.

*picipes* BREDDIN, 1903 (*Tetroxia*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 117–118)

♀ Holotypus, Kamerun, im DEI.

*picturatus* MILLER, 1948 (*Pirates*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 444, Fig. 38)

♀ Holotypus, Süd Java, im DEI.

*pirata* BREDDIN, 1900 (*Canthesancus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 175)

♂ Holotypus, Celebes meridionalis, leg. RIBBE, im DEI.

*placens* MILLER, 1948 (*Duriocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 416, Fig. 6)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Tebing Tinggi, NO. Sumatra, 25.–27. VI. 1884, leg. SCHULTHEISS.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 25. VI. 1884.

*pollex* MC ATEE & MALLOCH, 1925 (*Emesaya*)  
(Proc. Nat. Mus. Washington 67, Art. 1, 82–83)

♂ Holotypus, Corumba, Brazil, V., im Carnegie Mus. Acc. No. 2966; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Brazil, Goyas, Jatahy.

*praefectus* MILLER, 1948 (*Ectrychotes*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 452, Fig. 50)

♀ Holotypus, Sumatra, leg. VOLZ, im DEI.

*procera* BREDDIN, 1903 (*Afrocastra*)  
(Soc. ent. 18, 116)

Holotypus, Usambara.

DEI: „*Cleptria procera* BREDDIN, Typus“ (BREDDIN handschriftlich) „Ostafrika, Tanga“.

*pseustes* BREDDIN, 1900 (*Helonotus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 182–183)

Zahlreiche Syntypen, Insel Key.

DEI: Lectotypus, 4 Paralectotypen, Key Insel, hiermit festgelegt.

*puellula* BREDDIN, 1900 (*Mendola*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 178)

♂♂ Syntypen, Australia, N. S. Wales.

DEI: Lectotypus, N. S. Wales, hiermit festgelegt.

***pullata*** VILLIERS, 1942 (*Tribelocephala*)  
(Bull. Soc. Ent. France 47, 31–32)

Holotypus, Paratypen, Chine du Sud, Pingshiang, leg. KREYENBERG.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Pingshiang, Süd China, leg. KREYENBERG.

***robiosus*** MILLER, 1948 (*Tiarodes*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 436, Fig. 27)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Süd Java, im DEI.

***radians*** MILLER, 1948 (*Rhinocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 458, Fig. 59)

♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen, Zamboanga, Mindanao.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Mindanao, Zamboanga.

***rapax*** BREDDIN, 1903 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 18, 113–114)

♀ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

***regulus*** MILLER, 1948 (*Isyndus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 470, Fig. 74)

♀ Holotypus, Kelantan, Malacca, im DEI.

***rex*** BREDDIN, 1897 (*Pantoleistes*)  
(Ent. Nachr. 23, 341–342)

♀ Holotypus, Kamerun, im DEI.

***rubrifemur*** BREDDIN, 1899 (*Amulius*)  
(Rev. Ent. 18, 81–82)

Holotypus, Assam, im DEI.

***rubrifemur*** BREDDIN, 1901 (*Ectrychotes*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 115)

Holotypus, Celebes, Macassar, im DEI.

***rufiventris*** BREDDIN, 1901 (*Erbessus*)  
(Soc. ent. 16, 83)

♂ Holotypus, Surinam, im DEI.

***sachtlebeni*** MILLER, 1948 (*Endochus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 468, Fig. 72)

♀ Holotypus, Tengger Gebirge, Ost Java, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

***sachtlebeni*** VILLIERS, 1948 (*Ploearia*)  
(Faune de l'Empire Français, IX Hémiptères Réduviides de l'Afrique Noire, Paris, 446)

Larve Holotypus, Fernando Poo, leg. SCHLÜTER, im DEI.

***saeva*** BREDDIN, 1901 (*Mendis*)  
(Allg. Ztschr. Ent. 6, 115)

Holotypus, Celebes, Macassar, im DEI.

***sagax*** BREDDIN, 1903 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 18, 114)

Holotypus, Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

***sanguiniventris*** MILLER, 1956 (*Pothea*)  
(Beitr. Ent. 6, 7–8, Fig. 8)

♂ Holotypus, Bolivia, Yungas de la Paz, 1000 m, im DEI.

**scaber** MILLER, 1948 (*Oncocephalus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 422–423, Fig. 12)

♂ Holotypus, Montalban, Luzon, leg. SCHULTZE, im DEI.

**scutellaris** BREDDIN, 1903 (*Ectrichodia*)  
(Zool. Anz. 26, 512–513)

♂ Holotypus, Assam, Khasi Hills, im DEI.

**scheibei** KIRITSHENKO, 1938 (*Reduvius*)  
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 7)

♂ Holotypus, Nuristan (Afghanistan), Wama, im Peetsch Tal, 24. VII. 1935, leg. SCHEIBE, im DEI.

**schultheissi** MILLER, 1948 (*Ectrychotes*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 450–452, Fig. 49)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Tebing Tinggi, NO. Sumatra, 4. VI. 1884, 2. II. 1885, leg. SCHULTHEISS, im DEI.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 4. VI. 1884.

**schultzei** MILLER, 1948 (*Rhinocoris*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 455–456, Fig. 55)

♂ Holotypus, Bagnio, Luzon, leg. SCHULTZE, im DEI.

**scurra** BREDDIN, 1903 (*Tetroxia*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 118)

♀ Holotypus, Ceylon, leg. SCHLÜTER, im DEI.

**semicroceus** BREDDIN, 1900 (*Sphedanolestes*)  
(Ent. Nachr. 26, 45–46)

♂ Holotypus, Nova Guinea, Finschhafen, 1891, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**sericatus** BREDDIN, 1903 (*Sphedanolestes*)  
(Soc. ent. 18, 11–12)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, IV.–V., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**serraticollis** BREDDIN, 1903 (*Physoderus*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 125)

♂ Holotypus, West Java, Pengalengan, 4000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**servula** MILLER, 1948 (*Santosia*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 446, Fig. 41)

♀ Holotypus, SO. Borneo, im DEI.

**sicarius** BREDDIN, 1903 (*Arcesius*)  
(Soc. ent. 17, 169–170)

♀ Holotypus, Neu Guinea, im DEI.

**sordidus** MILLER, 1948 (*Pirates*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 439–441, Fig. 32)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Montalban, Luzon, leg. SCHULTZE.

DEI: Holotypus, Montalban, Luzon, leg. SCHULTZE.

**sororius guarani** LENT & WYGODZINSKY, 1954 (*Zelurus*)  
(Rev. Brasil. Biol. 14, 428–430, Fig. 20, 27, 28)

♂ Holotypus, Nova Teutônia, Santa Catarina, Brasil, XII. 1944, leg. PLAUMANN, in Sammlung WYGODZINSKY; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Brasilien, Nova Teutonia, 26. I. 1945/3. XII. 1946, leg. PLAUMANN.

**sparsus** MILLER, 1948 (*Pirates*)  
(Trans. Ent. Soc. London **99**, 441, Fig. 33)

♀ Holotypus, 3 ♀♀ Paratypen, Montalban, Luzon, leg. SCHULTZE.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**spectrum** BREDDIN, 1904 (*Phasmatorcoris*)  
(Soc. ent. **18**, 148–149)

♀ Holotypus, Bolivia.  
DEI: Holotypus, ohne Fundortangaben.

**speculator** MILLER, 1948 (*Panihous*)  
(Trans. Ent. Soc. London **99**, 470–472, Fig. 75)

♂ Holotypus, Sumatra, im DEI.

**spurca** BREDDIN, 1903 (*Tetroxia*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. **1903**, 120)

Syntypen, Deutsch Neu Guinea.  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangabe.

**spurca** BREDDIN, 1903 (*Tribelocephala*)  
(Soc. ent. **17**, 178)

♂ Holotypus, Deutsch Ost Afrika, Dares-Salaam, im DEI.

**squamulosus** VILLIERS, 1943 (*Heteropinus*)  
(Bull. Soc. ent. France **48**, 30–31, Fig. 8)

Holotypus, Cameroun, Mont Cameroun, Buéa, 800–1200 m, im Mus. Paris; Paratypen,  
Fernando Po, leg. EIDMANN, im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, Spanisch Guinea, Fernando Po, 12. II. 1940, leg. SCHLÜTER ?

**subobscura** BREDDIN, 1903 (*Cleptriola*)  
(Soc. ent. **18**, 108)

♂ Holotypus, Usambara, Nguelo, im DEI.

**subunicolor** BREDDIN, 1901 (*Darbanus*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle **24**, 94)

Syntypen, S. Celebes, Makassar, leg. PLATEN.  
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Celebes, Makassar, hiermit festgelegt.

**sumatrensis** MILLER, 1948 (*Thodelmus*)  
(Trans. Ent. Soc. London **99**, 426, Fig. 16)

♂ Holotypus, NO. Sumatra, Tebing Tinggi, 18. IX. 1884, leg. TRESCHER, im DEI.

**sycanoides** BREDDIN, 1901 (*Yolinus*)  
(Allg. Ztschr. Ent. **6**, 115)

Holotypus, Celebes, Makassar, VIII. IX. 1895, im DEI.

**tenax** BREDDIN, 1901 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. **16**, 83)

Syntypen, Ecuador.  
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

**tenuispinus** BREDDIN, 1913 (*Paloptus*)  
(Arch. Nat. gesch. **78** A (1912), Heft 11, 105)

♂♀ Syntypen, Deutsch Neu Guinea.  
DEI: 1 Lectotypus, Neu Guinea, hiermit festgelegt.

**theseus** BREDDIN, 1900 (*Pan thous*)  
(Abh. Senckenbg. Nat. Ges. 25, 174)

♂♀ Syntypen, Borneo, Baram flumen (183); Sumatra sept. or., Tebing tinggi, 15. II. 1884, leg. SCHUTLHEISS.

DEI: Lectotypus, NO. Sumatra, Tebing tinggi, 15. II. 1884, leg. SCHULTHEISS, hiermit festgelegt.

**tristis** BREDDIN, 1903 (*Tribelocephala*)  
(Soc. ent. 18, 115)

♂ Holotypus, Fernando Po, im DEI.

**ultima** MC ATEE & MALLOCH, 1926 (*Ploiaria*)  
(Philipp. Journ. Sci. 30, 144)

♂ Holotypus, 19 Paratypen, Mount Maquiling, Luzon; Paratypen, Malinao, Tayabas; Los Baños, Laguna; Cuernos Mountains, Negros, leg. BAKER.

DEI: 1 Paratypus, Mt. Makiling, Luzon, leg. BAKER.

**varius** BREDDIN, 1900 (*Sphedanocoris*)  
(Ent. Nachr. 26, 42–44)

Syntypen, N. S. Wales, im DEI.

DEI: Lectotypus, N. S. Wales, leg. RICHMOND, hiermit festgelegt.

**velutinus** BREDDIN, 1899 (*Crocias*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 16, 179–180, Fig. 9, 9a)

♀ Holotypus, Lombok, Sapit, 2000 Fuß, IV. 1896, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**venatrix** MILLER, 1948 (*Caecina*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 448, Fig. 45)

♂ Holotypus, N. Borneo, ex. coll. FRUHSTORFER, im DEI.

**vesbioides** BREDDIN, 1903 (*Sphedanolestes*)  
(Soc. ent. 18, 11)

Syntypen, Java.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Java, hiermit festgelegt.

**vicarius** KIRITSHENKO, 1938 (*Reduvius*)  
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 6–7)

♂ Holotypus, Nuristan (Afghanistan), Wama im Peetsch Tal, 24. VII. 1935, leg. SCHEIBE, im DEI.

**vicinus** SCHOUTEDEN, 1909 (*Phonolibes*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 415)

Syntypen, Belgisch Congo, Vivi und Benguella, leg. WELLMAN, im DEI und in Sammlung SCHOUTEDEN.

DEI: 1 Syntypus, Benguella, leg. WELLMAN.

**vigil** BREDDIN, 1900 (*Lyranna*)  
(Ent. Nachr. 26, 45)

Holotypus, N. S. Wales, Richmond, im DEI.

**villosulus** MILLER, 1948 (*Androclius*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 439)

♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen, Süd Java, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Süd Java.

*viduus* MILLER, 1948 (*Epidaurus*)  
(Trans. Ent. Soc. London 99, 468, Fig. 73)

♀ Holotypus, N. Borneo, leg. WATERSTRADT, im DEI.

*vorax* BREDDIN, 1903 (*Spiniger*)  
(Soc. ent. 13, 114–115)

♀ Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI.

*wahnschuffei* BREDDIN, 1900 (*Henricohahnia*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1900, 184–185)

Syntypen, Java, Montes Tengger.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Montes Tengger, 4000 Fuß, 1890, leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

*waterstradti* BREDDIN, 1903 (*Tiarodes*)  
(Sitz. Ber. Ges. nat. Fr. 1903, 111–112)

♀ Holotypus, Nord Borneo, leg. WATERSTRADT, im DEI.

*weyrauchi* LENT & WYGODZINSKY, 1951 (*Zelurus*)  
(Mem. Inst. Osw. Cruz 49, 591–594, Fig. 19, 20)

♂ Holotypus, Quebrada Verde, Lurin cerca de Lima, 150 m, Peru, 18. VI. 1950, leg. AGUILLAR, im Inst. Med. Reg. Tucumán; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Quebrada Verde, Lurin cerca de Lima, 100 m, 28. VIII. 1949, leg. WEYRAUCH.

*zischkai* WYGODZINSKY, 1953 (*Agrioleptes*)  
(Rev. brasil. Biol. 13, 376–377, Fig. 19–28)

♂ Holotypus, 3 ♂♂, 15 ♀♀ Paratypen, Cochabamba, Bolivia, 2000 m, leg. ZISCHKA.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

*tiro* BREDDIN (*Glymmatophora*)

DEI: 1 Ex. ohne Fundortangabe, 1 Ex. Bonnefoi, Transvaal, als Typen ausgezeichnet.

### Henicocephalidae

*dimorphus* JEANNEL, 1942 (*Didymocephalus*)  
(Ann. Soc. Ent. France 110 (1941), 348–350, Fig. 20, 40, 41 b)

Holotypus, Paratypen, Ost Afrika, Kenya, Mont Elgon, Kitale bei l'Elgon Saw Mill, Mus. Paris; Paratypen, Koptawelil und Suam Fishing Hut.; Nairobi; Naivasha; Escarpment. Belg. Congo, Ruanda, Kissenyi, leg. SCHOUTEDEN.  
DEI: 1 Paratypus, Kenya, Kitale, Uasin Gishu, 2100 m.

*leoninus* JEANNEL, 1942 (*Didymocephalus*)  
(Ann. Soc. Ent. France 110 (1941), 353–354)

2 ♀♀ Syntypen, Australien, Neu Süd Wales, Sydney, leg. LÜDDEMANN, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*saetosus* JEANNEL, 1942 (*Didymocephalus*)  
(Ann. Soc. Ent. France 110 (1941), 353)

2 ♀♀ Syntypen, Australien, Victoria, Dandenong Ranges, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.



*tenuis* JEANNEL, 1942 (*Systemloderes*)  
(Ann. Soc. Ent. France 110 (1941), 306)

♂ Holotypus, Costa Rica, La Caja bei San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI.

### Nabidae

*affinis* POPPIUS, 1914 (*Phorticus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 3)

♂♀ Syntypen, Formosa, Lambeh, II. 1908, leg. SAUTER, im DEI und Mus. Helsingfors.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

*amazonica* POPPIUS, 1914 (*Pagasa*)  
(Ann. Mus. Zool. Petersb. 19, 135–136)

♂ Holotypus, Amazonas, Obidos, leg. ROLLE, im DEI.

*bergrothi* POPPIUS, 1914 (*Alloeorrhynchus*)  
(Ann. Mus. Zool. Petersb. 19, 137–138)

♂ Holotypus, Java, leg. FÖRSTER, im DEI.

*breddini* POPPIUS, 1914 (*Nabis*)  
(Ann. Mus. Zool. Petersb. 19, 134–135)

♀ Holotypus, Süd-Afrika, Salisbury, leg. BODONY, im DEI.

*deceptivus* HARRIS, 1928 (*Nabis*)  
(Ent. Amer. 9, 45–46)

♂ Holotypus, Brownsville, Texas, 16. XII. 1911, in Sammlung HARRIS; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Gainesville, Fla.

*formosanus* POPPIUS, 1914 (*Phorticus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 3–4)

♀ Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), 7. IX. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

*sauteri* POPPIUS, 1914 (*Reduviolus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 4–5)

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypus, Formosa, Anping, 7. IV. 1912, leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*similis* POPPIUS, 1914 (*Pagasa*)  
(Ann. Mus. Zool. Petersb. 19, 136–137)

♀ Holotypus, Amazonas, Obidos, leg. ROLLE, im DEI.

*simplicipes* POPPIUS, 1914 (*Arbelopsis*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 6)

Syntypen, 1 ♂, 2 ♀♀, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER; 2 ♂♂, 1 ♀, Formosa, Taihorinsho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.  
DEI: 2 Syntypen, Fuhosho, Formosa, 7. IX., leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihornisho, 7. IX., leg. SAUTER.

### Cimicidae

*stadleri* HORVÁTH, 1936 (*Cimeax*)  
(Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 6, 13–14)

Syntypen, Deutschland, Hobbach im Spessart, im Mus. Budapest und in Sammlung SINGER.  
DEI: 2 Syntypen, Spessart, Hobbach im Elswatal, Speicher der Schule, leg. SINGER.

**Anthocoridae***laeviusculus* POPPIUS, 1914 (*Cardiastethus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 7–8)

1 Syntypus, Formosa, Daitotei, IX. 1906, Lichtfang, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Anping, VII. 1912, leg. SAUTER; im DEI und im Mus. Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, VII. 1912, leg. SAUTER.

*longiceps* POPPIUS, 1914 (*Cardiastethus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 8)

♀ Holotypus, Formosa, Taihorin, VIII. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

*megalophthalmus* CARAYON, 1957 (*Cardiastethus*)

(Ann. Soc. Ent. France 126, 185–187)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Cameroun Ebolowa, 1956, leg. DIVARET; 10 ♂♂, 10 ♀♀, Paratypen, von verschiedenen Lokalitäten, Cote d'Ivoire du Cameroun, Moyen Congo, im Mus. Paris.

DEI: 2 Paratypen, Cote d'Ivoire, Adiopodoumé nids de Ploceus, 1956, leg. GRÉARD.

*nigriceps* WAGNER, 1949 (*Ectemnus*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 26, Nr. 364, 1–2, Fig. 1)

Holotypus, 41 Paratypen; Leipzig, Kleinzschocher, Dewitz bei Taucha, Albertpark, leg. DORN; Schönau, leg. MICHALK, in Sammlung WAGNER.

DEI: 2 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Schönau bei Leipzig, 24. VIII. 1944/19. IX. 1944; 1 Paratypus, Leipzig Kzsch., 20. X. 1945, leg. MICHALK.

*pini* BAERENSPRUNG, 1858 (*Anthocoris*)

(Berliner Ent. Ztschr. 2, 190–191)

Bei Berlin unter Kieferrinde.

♀ Neotypus, Fürstenberg, in Sammlung PUTON im Pariser Mus.; 7 Paraneotypen, vom selben Fundort, 5 im Pariser Mus., 1 im DEI und 1 in Sammlung PÉRICART. Der Neotypus wurde von PÉRICART (Bull. Soc. ent. France 72, 55–56; 1967: *Elatophilus*) festgelegt. Die Gültigkeit dieser Festlegung hängt von der Entscheidung der Nomenklaturkommission ab, da nachträglich das Originalmaterial dieser Art aufgefunden wurde. (GÖLLNER-SCHIEDING & PÉRICART, Bull. zool. Nomencl. 25, Part 6, 235–236; 1969).

DEI: 1 Neoparatypus, Fürstenberg i. M., 15. IV. 1889, leg. KONOW.

*strigicollis* POPPIUS, 1914 (*Triphleps*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 9)

♀ Holotypus, Formosa, Anping, 7. VI., leg. SAUTER, im DEI.

**Miridae***alpestris* WAGNER, 1941 (*Cremnocephalus*)

(Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 10, 99–103)

Holotypus, 160 Paratypen zahlreicher Fundorte in den Alpen.

DEI: 5 Paratypen, Tirol, Biberwier, 31. VII. 1941/2. VIII. 1941, leg. KÖLLER.

*annulicollis* POPPIUS, 1914 (*Cyrtorrhinus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 66)

♂ Holotypus, Formosa, Tainan, 7. IV., leg. SAUTER, im DEI.

*apicalis* POPPIUS, 1914 (*Deraeocoris*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 40–41)

2 ♀♀ Syntypen, Formosa, Anping, 7. V. 1911/V. 1912, leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors; Formosa, Taihorinsho, V. 1910, im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, V. 1912, leg. SAUTER.

**arenarius** HORVÁTH, 1884 (*Labops*)

(Term. Füzetek 8, 14–15)

Syntypen, Hungaria, Rákos-Palota, ipse; Tokaj, leg. CHRYSER; Kóly, leg. BIRO.  
 DEI: 1 Syntypus, Ungarn, 30. V. 1883, leg. POLATA.

**bakeri** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 30–31)

Syntypen, Formosa, Kosempo, IV. 1912, leg. SAUTER; Formosa, Taihorinsho, 7. IX./7. XI., leg. SAUTER; Formosa, Tainan, 7. VIII., leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors; Philippinen, Los Banos, leg. BAKER, im Mus. Budapest.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 1909, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Tainan, 7. VII., leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, IV. 1912.

**basalis** POPPIUS, 1914 (*Prodromopsis*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 56–57)

Syntypen, Formosa, Taihorin, I. 1910/7. XI. 1911, leg. SAUTER; Formosa, Taihorinsho, 7. IX. 1909, leg. SAUTER; Formosa, Fuhosho, 1. IX., leg. SAUTER; im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.

DEI: 14 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 7. IX. 1909, leg. SAUTER; 16 Syntypen, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER.

**bipunctatus** POPPIUS, 1914 (*Creontiades*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 11–12)

♂ Holotypus, Formosa, Anping, 7. VIII., leg. SAUTER, im DEI.

**bipuncticollis** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 25)

♂ Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), VII. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

**brevicornis** POPPIUS, 1914 (*Helopeltis*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 52–53)

Syntypen, Formosa, Anping, III., leg. SAUTER; Formosa, Fuhosho, XI., leg. SAUTER; Formosa, Kosempo, VII. 1909, leg. SAUTER; Formosa, Taihorinsho, VIII. 1909, leg. SAUTER; Formosa, Taihorin, VII. 1911, leg. SAUTER; Formosa, Kankau (Koshun), IV. 1912, leg. SAUTER; Formosa, Suicharyo, 7. X. 1911, leg. SAUTER; Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER; Formosa, Teras, II. 1909, leg. SAUTER; im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. IV. 1912, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Suisharyo, 7. X. 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Teraso, II. 1909, leg. SAUTER; 5 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 1912, leg. SAUTER; 9 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 1909, leg. SAUTER.

**caliginosus** WAGNER, 1950 (*Macrolophus*)

(Boll. Assoc. Rom. Ent. 5, 29–31, Fig. 6a–e)

♂ Holotypus, Paratypen, 2 ♂♂, 14 ♀♀, Insel Ischia bei Neapel, 23. VII.–16. VIII. 1936, leg. MICHALK; 1 ♂, 4 ♀♀, Insel Biseva bei Spalato, Dalmatien, Supetar, 22. IV. 1948; in Sammlung WAGNER.

DEI: 1 Paratypus, Ins. Ischia, Italia, 16. VIII. 1936, leg. MICHALK.

**cephalotes** POPPIUS, 1914 (*Decomia*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 74–75)

♂ Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), VIII. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

**cerastii** WAGNER, 1951 (*Dicyphus*)  
(Comm. Biol. 12, 6, 13–15)

Holotypus, 46 Paratypen; Dalmatien, Split, 6. XI. 1945/20. V. 1947/9. V. 1948; Janjina, 18. V. 1948; Korčula, 9. VI. 1948; Komiza, 4. V. 1946; Salona, 23. V. 1943; Sastovo, 11. V. 1948; Vaganj, 21. IX. 1948, leg. NOVAK; Kleinasien, Smyrna, leg. SAHLBERG; Krim, Eupatoria.

DEI: 1 Paratypus, Split, Dalmatien, 9. V. 1948, leg. NOVAK.

**clypeale** POPPIUS, 1914 (*Megacoelum*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 14–15)

♀ Holotypus, Formosa, Kosempo, X., leg. SAUTER, im DEI.

**collinus** WAGNER, 1941 (*Plagiognathus*)  
(Stett. Ent. Ztg. 102, 249–250)

Holotypus, 89 Paratypen, Vorpommern, Geesower Hügel, 14. VII. 1939; Mescherin, 14./15. VII. 1939; Gartzter Schrey, 14. VII. 1939; Westpreußen; in Sammlung WAGNER.

DEI: 1 Paratypus, Vorpommern, Geesower Hügel, 17. VII. 1939, leg. WAGNER; 1 Paratypus, Vorpommern, Gartzter Schrey, 14. VII. 1939, leg. WAGNER.

**conradti** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)  
(Acta Soc. Sci. Fennicae 44 Nr. 3, 118–119)

♂♀ Syntypen, Kamerun, Joh. Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT, im DEI und im Mus. Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT; 1 Syntypus, N. Kamerun, J. Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT.

**consersipes** REUTER, 1909 (*Phytocoris*)  
(Acta Soc. Sci. Fennicae 36 Nr. 2, 22–23)

♂♀ Syntypen, Washington, leg. WEIDEMANN.

DEI: 1 Syntypus, Washington DC, 18. VIII. 1894, leg. HEIDEMANN.

**corallinus** POPPIUS, 1914 (*Pachypeltis*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 54–55)

4 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), VI.–VII. 1912, leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**dalmatinus** WAGNER, 1951 (*Dichrooscytus*)  
(Ztschr. Wien. Ent. Ges. 36, 23–24, Fig. 1b, 2b, e, h, l)

♂ Holotypus, 11 ♂♂, 15 ♀♀, Paratypen, Dalmatien, Lastovo, 11. V. 1948 und Pinarske Plaže, 25. V. 1948, leg. NOVAK, in Sammlung WAGNER und in Sammlung NOVAK.

DEI: 1 Paratypus, Dalmatien, Pitve Plaže, 25. V. 1948, leg. NOVAK.

**delamarei** WAGNER, 1955 (*Tinicephalus*)  
(Bull. Soc. Ent. France 60, 93–96, Fig. B 1, 3, 5, 7, 11)

Holotypus, Paratypen; 30 ♂♂, 35 ♀♀, Pyrenées Orientales, Camp de Terrails, 500 m, 6. VI. 1953; 1 ♀, Baillaurie Tal, 500 m, 2. VI. 1953, leg. WEBER & WAGNER; 1 ♀, Umgebung Banyuls, 3. VI. 1925, leg. RIBAUT; in Sammlung WAGNER.

DEI: 1 Paratypus, Südfrankreich, Pyrenées or., Terrails, 500 m, 6. VI. 1953, leg. WAGNER.

**disciger** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 34–35)

♂♀ Syntypen, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER.

**dromedarius** POPPIUS, 1914 (*Tingitopsis*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 24–25)

♀ Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), VI. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

**elegans** POPPIUS, 1915 (*Onomaus*)  
(Ann. Mus. Hung. 13, 6–7)

♂♀ Syntypen, Assam, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Assam.

**elongatus** POPPIUS, 1914 (*Cyrtorrhinus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 65–66)

♂ Holotypus, Formosa, Anping, 7. V. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

**eous** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 27)

♂ Holotypus, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI.

**fasciaticollis** POPPIUS, 1914 (*Helopeltis*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 53)

Syntypen, Formosa, Kosempo, XI. 1908, leg. SAUTER; Formosa, Fuhosho, VII. 1904, leg. SAUTER; Formosa, Taihorinsho, X., leg. SAUTER; Formosa, Kankau (Koshun), III. 1912, leg. SAUTER; im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.  
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), V. 1912, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. X., leg. SAUTER.

**fennicus** WAGNER, 1954 (*Euryopicoris*)  
(Notulae Ent. 34, 82–84, Fig. 1–6)

♂ Holotypus, Finnland, Kuhmo, 15.–29. VI. 1953, leg. LINNAVUORI; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung, in Sammlung WAGNER, im Mus. Helsingfors und in Sammlung LINNAVUORI.

DEI: 1 Paratypus, Suomi, Kn. Kuhmo, 16.–29. VI. 1953, leg. LINNAVUORI.

**formosanus** POPPIUS, 1914 (*Creontiades*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 13–14)

Syntypen: 4 ♂♂, Formosa, Taihorinsho, 7. IX., leg. SAUTER; 1 ♀, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. IX. 1909, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER.

**formosanum** POPPIUS, 1914 (*Tingitotum*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 22–23)

♀♀ Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 7. XI., leg. SAUTER; Formosa, Hoozan, XII. 1909, leg. SAUTER; im DEI und im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. XI. 1909, leg. SAUTER.

**fuhoshoënsis** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 32–33)

♂ Holotypus, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI.

**fulvigenis** POPPIUS, 1914 (*Taivaniella*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 58)

♀ Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 7. IX. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

**gemellatus maritima** WAGNER, 1949 (*Lygus*)  
(Verh. Ver. nat. Heimatforsch. 30, 37–38)

Holotypus, Paratypen, Amrum, leg. WEBER, in Sammlung WAGNER.  
DEI: 5 Paratypen, Insel Amrum, Nebel, 23. VII. 1949/16. VII. 1950.

**horni** POPPIUS, 1911 (*Megacoelum*)  
(Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 53 A, Nr. 2, 13–14)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Ceylon, Puttalam, leg. HORN, im DEI und im Mus. Helsingfors.  
DEI: 1 Syntypus, Putalam, Ceylon, leg. HORN.

**immaculipennis** POPPIUS, 1914 (*Odoniella*)  
(Acta Soc. Sci. Fennicae 44, Nr. 3, 128–129)

♂ Holotypus, Bonjon, III., im DEI.

**insularis** POPPIUS, 1914 (*Stenotus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 17–18)

♀ Holotypus, Anping, 8. VII. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

**kirkaldyi** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 35)

♀ Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI.

**kosempoënsis** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 26)

Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. II. 1911, leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.  
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**lineatus** WAGNER, 1952 (*Teratocoris*)  
(Ent. Berichten 14, Nr. 328, 158–160, Fig. 1–7)

Holotypus, 120 Paratypen; Schleswig Holstein, Heiligenhafen, 11./13. VI./2. VII. 1950, leg. REMANE; Bottsand bei Kiel, 2. VII. 1949, leg. REMANE & WAGNER; Holland, Texel, 30. VII.–1. VIII. 1951, leg. GRAVESTEN; Nordschweden, Harads, 25.–26. VII. 1926, Arvidsjaur, 21. VII. 1942, leg. OSSIANNILSSON; Abisko, 15. VIII. 1948, Vassijaure, 18. VIII. 1948, leg. GRAVESTEN; Nordrußland, Imandra See, leg. SAHLBERG; in Sammlung WAGNER.  
DEI: 1 Paratypus, Bottsand, 2. VII. 1949.

**longicollis** POPPIUS, 1914 (*Stenodema*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 43–44)

♀ Holotypus, Formosa, Kosempo, 7. I. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

**lugubris** POPPIUS, 1914 (*Bolthriomiridius*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 46)

Syntypen, Formosa, Fuhosho, VII., leg. SAUTER; Formosa, Banshoryo Distr., leg. SAUTER; Formosa, Sokutsu, VIII., leg. SAUTER; Formosa, Kosempo, IV., leg. SAUTER, im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. IV. 1912, leg. SAUTER; 12 Syntypen, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, VI./VII./VIII. 1912, leg. SAUTER.

**matsumurae** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 29–30)

♀ Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 7. XI., leg. SAUTER, im DEI.

**microphthalmus** WAGNER, 1948 (*Poecilosecytus*)  
(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 26, Nr. 351, 1–3, Fig. 1a, 2a)

Holotypus, zahlreiche Paratypen; Bavaria, Nördlingen, Regensburg, Coburg, Steppberg, Munich, Lentstetten, Schlurfeld, Aschaffenburg, Spessart; Baden, Ketsch; Hessen, Taunus, Mainz, Hanau; Styria, Admont, Hall, Weizklamm; Hungary, Limontornya; Italy, Lazio; Belgium, Ethe, Torgny.

DEI: 1 Paratypus, Steiermark, leg. STROBL.

**minor** WAGNER, 1950 (*Plesiocoris*)

(Opusc. Ent. 15, 135–138, Fig. 1)

♂ Holotypus, Amrum, Vogelkoje, 24. VII. 1949; 10 ♂♂, 32 ♀♀, Paratypen, Amrum, Norddorf, 22. VII. 1949; Vogelkoje, 23./24. VII. 1949; Insel Sylt, Kampen, 25. VII. 1946, in Sammlung WAGNER.

DEI: 4 Paratypen, Insel Amrum, Vogelkoje, 23./24. VII. 1949.

**minutus** POPPIUS, 1914 (*Creontiades*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 12–13)

♂♀ Syntypen, Formosa, Anping, 24. VI./IX., leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors; Formosa, Takao, leg. SAUTER, im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, 29. VI. 1912, leg. SAUTER.

**niger** POPPIUS, 1914 (*Lygus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 35–36)

Syntypen: 1 ♀, Formosa, Taihorinsho, 7. IX. 1909, leg. SAUTER, im DEI; 1 ♀, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER, im Mus. Helsingfors; Luzon, Mt. Makiling, leg. BAKER, im Mus. Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. IX. 1909, leg. SAUTER.

**nigroquadristriatus** KIRKALDY, 1902 (*Umslopogus*)

(Trans. Ent. Soc. London 1902, 254–255, Taf. V Fig. 11, Taf. VI Fig. 7, 25)

Syntypen, Natal, Howick.

DEI: 1 Syntypus, Natal, Howick (von KIRKALDY als *miriformis* bezettelt, aber offenbar identisch mit der oben genannten Art.)

**obscuricornis** POPPIUS, 1914 (*Engytatus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 62)

Syntypen, Formosa, Anping, 7. VII., leg. SAUTER; Formosa, Tainan, 22. VII., leg. SAUTER; im DEI und im Mus. Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, 7. VII., leg. SAUTER.

**orchidearum** REUTER, 1902 (*Eccritotarsus*)

(Öfv. Finska Forh. 44, 157)

♀♀ Syntypen, in Orchideen in Brasilia (Porto Alegre!); Sta. Catharina, leg. LINDEN.

DEI: 2 Syntypen, aus Brasilien mit Orchideen eingeschleppt.

**orientale** POPPIUS, 1914 (*Teratophyllum*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 9–10)

Syntypen: 1 ♀, Formosa, Kankau (Koshun), 7. IV. 1912, leg. SAUTER, im DEI; 1 ♂, Shis A 561, V.–VI. 1912, im Mus. Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), V. 1912, leg. SAUTER.

**orientalis** POPPIUS, 1914 (*Dicyphus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 60–61)

♂ Holotypus, Formosa, Tainan, 22. VII., leg. SAUTER, im DEI.

**orientalis** POPPIUS, 1914 (*Marshalliella*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 69–70)

♂ Holotypus, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI.

**orientalis** POPPIUS, 1914 (*Orthotylus*)

(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 69)

Syntypen, Formosa, Anping, VI. 1908/V. 1912, leg. SAUTER, im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Anping, V./VI.; V. 1912, leg. SAUTER.

**pallidus** POPPIUS, 1914 (*Helopeltis*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 54)

3 ♀♀, Syntypen, Formosa, Kankau, 7./22. IV./V. 1912, leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kankau, 7. IV. 1912, leg. SAUTER.

**parviceps** POPPIUS, 1914 (*Cimicicapsus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 41)

2 ♀♀ Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), IV.—V. 1912, leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**pullulus** POPPIUS, 1914 (*Pilophorus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 64—65)

♀ Holotypus, Formosa, Tainan, VIII., leg. SAUTER, im DEI.

**pusillus** POPPIUS, 1914 (*Peritropis*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 49—50)

♀ Holotypus, Formosa, Tainan, 7. IV. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

**pygmaeus** POPPIUS, 1914 (*Cardiastethus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 7)

4 Syntypen, Formosa, Anping, 7. VI., leg. SAUTER, im DEI und Mus. Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, 7. VI./VII., leg. SAUTER. Nach CARAYON (in litt.) gehört der 2. Syntypus nicht zu dieser Gattung.

**pygmaeus** WAGNER, 1955 (*Dimorphocoris*)  
(Beitr. Ent. 5, 338—340, Fig. 1—5)

Holotypus, 26 Paratypen, Südfrankreich, Pyrenées orientales, Tour de la Massane, 600 m, 25. VI. 1954, leg. WEBER & WAGNER, in Sammlung WAGNER.

DEI: 1 Paratypus, Südfrankreich, Umg. Banyuls, (P. O.) Massane, 25. VI. 1954, leg. WAGNER.

**rubrovariegata** KIRKALDY, 1902 (*Zanessa*)  
(Trans. Ent. Soc. London 1902, 270, Taf. V Fig. 13, Taf. VI Fig. 15)

♀♀ Syntypen, Australia, Victoria, Alexandra.

DEI: 1 Syntypus, Victoria, Alexandra, leg. BILLINGHURST.

**rufescens** POPPIUS, 1914 (*Cephalocapsidea*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 71—72)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**sanguinalis** KIRKALDY, 1902 (*Thaumastomiris*)  
(Journ. Bomb. Soc. 14, 57, Taf. A Fig. 6; Taf. B Fig. 4)

Syntypen, Ceylon, Peradeniya, leg. GREEN.

DEI: 1 Syntypus, Peradeniya, Ceylon.

**sauteri** POPPIUS, 1914 (*Deraeocoris*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 38—39)

3 Syntypen, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI und Mus. Helsingfors; Formosa, Kosempo, leg. SAUTER, im Mus. Budapest.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Tainan, 7. IV. 1912, leg. SAUTER.



**sauteri** POPPIUS, 1914 (*Eurystylus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 15–16)

♀ Holotypus, Formosa, Kosempo, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI.

**sauteri** POPPIUS, 1914 (*Fulvius*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 50–51)

Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. VII. 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, VIII. 1909, leg. SAUTER; im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.

DEI: 8 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. VII. 1911, leg. SAUTER.

**sauteri** POPPIUS, 1912 (*Lygus*)  
(Ent. Mittl. 1, 303–304)

5 Syntypen, Formosa, Chip Chip, II. 1909, leg. SAUTER, im DEI und im Mus. Helsingfors.  
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**schenklingi** POPPIUS, 1914 (*Malalasta*)  
Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 21)

3 ♀♀ Syntypen, Formosa, Fuhosho, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 7. IX. 1909, leg. SAUTER.

**sicilianus** WAGNER, 1954 (*Orthotylus*)  
(Beitr. Ent. 4, 469–470, Fig. 1–5)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, 5 ♀♀ Paratypen, Sizilien, Monte Ätna, Castagneti di Pedara, 900–1100 m, 17. VI. 1949; 6 ♂♂, 4 ♀♀, Sizilien, Canton, 1400–1700 m/1700–1800 m, 18. VII. 1948; 2 ♂♂, 5 ♀♀, Monte Manfrè, 1400 m, 30. V. 1949; 1 ♂, 2 ♀♀, Sizilien, Pineta, 1600–1700 m, 29./30. VII. 1948/29. VII. 1949; leg. HARTIG & GRIESHEIM, in Sammlung WAGNER.

DEI: 1 Paratypus, Mte. Etna vers. mer. Canton, 1700–1800 m, 18. VII. 1948, leg. HARTIG.

**sordidus** POPPIUS, 1914 (*Deraeocoris*)  
(Arch. Nat. gesch. 80A, Heft 8, 39)

♂ Holotypus, Formosa, Kosempo, 7. V. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

**tamaninii** WAGNER, 1951 (*Dicyphus*)  
(Comm. Biol. 12 (6), 16–17)

Holotypus, 83 Paratypen; Dalmatien, Lumbarda, 17. VIII. 1949; Palagruza, 19. V. 1949; Sušac, 20. VI. 1948; Split, 19. V. 1945, leg. NOVAK; Ligurien; Puglien; Insel Capraia; Tunis, leg. TAMANINI; in Sammlung WAGNER.

DEI: 1 Paratypus, Dalmatien, Split, 19. V. 1945, leg. NOVAK; 2 Paratypen, Dalmatien, Palagruža, 19. V. 1949, leg. NOVAK.

**uzeli** POPPIUS, 1911 (*Phytocoris*)  
(Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 53 A, Nr. 2, 8–9)

Syntypen, 1 ♂, Peradeniya, 5. I. 1902, leg. UZEL, im Mus. Wien; mehrere Syntypen, Ceylon, Matala; Paradna; Kanthaley; Anuradhapura; Négombo; leg. HORN.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, Paradna; Matala; Kanthaley; Negombo, leg. HORN.

**velocipedoides** POPPIUS, 1914 (*Rhinocylapidius*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 49)

Syntypen, Formosa, Fuhosho, VII., leg. SAUTER, im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Fuhosho, II./VII. 1909, leg. SAUTER.

**viticinus** SEIDENSTÜCKER, 1954 (*Brachynotocoris*)  
(Beitr. Ent. 4, 82–84, Fig. 21–28)

♂ Holotypus, 10 ♂♂, 14 ♀♀, Paratypen, Syrien, nächst dem Kal'at Sedschar Larissa nordwestlich von Hama, längs der sandigen Uferterrasse des Nahr el Asi, Fluß Orontes, 25. V. 1952, im DEI und in Sammlung SEIDENSTÜCKER.

DEI: Holotypus, 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*vittatus* POPPIUS, 1914 (*Eolygus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 37–38)

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 7. IX.—7. XI., leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. VII. 1909, leg. SAUTER; im DEI, im Mus. Helsingfors und im Mus. Budapest. DEI: 22 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 1909, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. VII. 1909, leg. SAUTER.

*v-nigrum* POPPIUS, 1914 (*Lygus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 31)

♂ Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 7. IX. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

*ornator* KIRKALDY (*Kosmematocoris*)

DEI: 1 Ex. Pulo Laout, leg. GRIBOD, als Cotypus ausgezeichnet.

### Saldidae

*azteca* DRAKE & HOTTES, 1949 (*Saldula*)  
(Proc. Biol. Soc. Wash. 62, 177–179, Taf. X Fig. 3)

♂ Holotypus, Aztec, New Mexico, 26. VIII. 1934, leg. DRAKE & ANDRE, in Sammlung DRAKE; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 3 Paratypen, Gateway, Colo., 8. IX. 1949, leg. DRAKE & HOTTES.

*ourayi* DRAKE & HOTTES, 1949 (*Saldula*)  
(Proc. Biol. Soc. Wash. 62, 179–180, Taf. X Fig. 6)

♂ Holotypus, Soap Lake, Washington, 29. VIII. 1949, leg. DRAKE & HOTTES, in Sammlung DRAKE; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Soap Lake, Wash., 30. VIII. 1949, leg. DRAKE & HOTTES.

### Cryptostemmatidae

*descolei* WYGODZINSKY, 1952 (*Nannocoris*)  
(Acta Zool. Lilloana 10, 58–61, Fig. 22–40)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, 4 ♀♀, Paratypen, Pia de la Sierra de San Javier, Tucuman, 30. VIII. 1948/24. VI. 1950, leg. WYGODZINSKY, in der Sammlung des Inst. Ent. Fund MIGUEL LILLO; 7 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, Valle de San Javier, Tucum., 800 m, 15. VIII. 1950, leg. WYGODZINSKY, in Sammlung WYGODZINSKY.  
DEI: 1 Paratypus, Valle S. Javier, Tucuman, 800 m, 15. VIII. 1950, leg. WYGODZINSKY.

*taivanus* POPPIUS, 1914 (*Ceratocombus*)  
(Arch. Nat. gesch. 80 A, Heft 8, 76–77)

♂ Holotypus, Formosa, Akau, XII. 1907, leg. SAUTER, im DEI.

### Hebridae

*eckerleini* JORDAN, 1954 (*Naeogeus*)  
(Beitr. Ent. 4, 601–604, Fig. 1, 2)

Holotypus, Paratypen, Gallia meridionalis, Dignes, an Champ du Bés, 18. VII. 1953, leg. ECKERLEIN, in Sammlung JORDAN, ECKERLEIN und im DEI.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*latensis* HALE, 1926 (*Naeogeus*)

(Rec. South Australian Mus. 3, 196–198, Fig. 81)

Holotypus, Paratypen, South Australia: Adelaide und Myponga Swamps, leg. HALE; Tasmania, Devonport, leg. LEA; New South Wales, Glenfiels, leg. LEA.

DEI: 6 Paratypen, River Torrens, Adelaide, S.-Austr., leg. HALE.

**Velidae***boliviana* BREDDIN, 1898 (*Paravelia*)

(Jahrb. Nat. Vereins Magdeb. 1896–97 (1898), 160–161)

♀ Holotypus, Bolivia, im DEI.

*hambletoni* DRAKE & HARRIS, 1933 (*Rhagovelia*)

(Proc. Biol. Soc. Wash. 46, 48)

♂ Holotypus, zahlreiche Paratypen, Vicosá, Minas Geraes, Brasil, 6. VI. 1932, leg. HAMBLETON, in Sammlung DRAKE.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*mancini lyciae* TAMANINI, 1955 (*Velia*)

(Bol. Soc. Ent. Ital. 85, 41–42, Fig. 14, 15)

Holotypus, 4 Paratypen, Macri nella Licia, Turchia, im Mus. Wien und in Sammlung TAMANINI; 1 ♀ Paratypus, Monti Tauro della Cilicia, 1895, leg. HOLTZ, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Asia minor, Taurus Cilic, 1895, leg. HOLTZ.

*panda* DRAKE & HARRIS, 1935 (*Rhagovelia*)

(Proc. Biol. Soc. Wash. 48, 193)

♂ Holotypus, Paratypen, Chiquimula, Guatemala, VI. 1930, in den Sammlungen DRAKE & HARRIS.

DEI: 1 Paratypus, Chiriquimula, Guatemala, VI. 1930.

*peramoena* HALE, 1925 (*Microvelia*)

(Arkiv Zool. 17 A, Nr. 20, 8–9)

Holotypus, Paratypen, South Australia: Myponga Swamps, Adelaide, Mount Lofty Ranges, Murray River, leg. HALE; Queensland: Atherton, Cape York Peninsula, leg. Mjöberg; New South Wales: Mittagong, leg. LEA; Victoria: Yarra Glen, leg. BARRETT; Tasmania: Hobart, Launceston, leg. LEA; im South Austr. Mus.

DEI: 3 Paratypen, Myponga, S. Australia, leg. HALE.

*rotundanotata* HUNGERFORD, 1930 (*Velia*)

(Journ. Kansas Ent. Soc. 3, 23–24)

2 ♂♂, 13 ♀♀, Typen, La Plata, im DEI; 9 Typen, Minas Geraes, im Mus. Kopenhagen.

DEI: Holotypus, 8 Paratypen, La Plata.

*versuta* DRAKE & HARRIS, 1935 (*Rhagovelia*)

(Proc. Biol. Soc. Wash. 48, 37)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Rio Paucartambo, Quiroz, Peru, XII. 1933, in Sammlung DRAKE und im U. S. N. M.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*watsoni* DRAKE, 1919 (*Velia*)

(Florida Buggist 3, 1–2)

Holotypus, zahlreiche Paratypen, Gainesville, Florida, 1918, in Sammlung DRAKE.

DEI: 1 Paratypus, Gainesville, Flo., 7. II. 1918, leg. DRAKE.

**Cerridae**

**aëlio** BREDDIN, 1906 (*Ptilomera*)  
(Soc. ent. 21, 9)

♀♀ Syntypen, Neu Guinea.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Neu Guinea, Timmemma, 6.—7. VIII. 1903, hiermit festgelegt.

**argus** BREDDIN, 1903 (*Ptilomera*)  
(Soc. ent. 17, 147—148)

♂ Holotypus, West Java, Sukabumi, 2000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**asbolus** BREDDIN, 1905 (*Ptilomera*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 22, 132—134, Fig. 10, 11)

Syntypen, Java, Tjilowong-Fluß, 25. II. 1905, leg. FOERSTER; Java, Buitenzorg, leg. KRAEPELIN.

DEI: Lectotypus, Java, leg. FOERSTER, hiermit festgelegt.

**asymmetricus** HUNGERFORD, 1932 (*Platygeris*)  
(Bull. Brooklyn Ent. Soc. 27, 178—180)

Holotypus, zahlreiche Paratypen, Rio Virilla, Costa Rica, 26. XII. 1931, leg. SCHMIDT, im Ent. Mus. Kansas.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**clanis** DRAKE & HARRIS, 1932 (*Rheumatobates*)  
(Pan Pacific Ent. 8, 157—158)

♂ Holotypus, 351 Paratypen, Rio Grande, British Honduras, in Sammlung DRAKE.

DEI: 2 Paratypen, Rio Grande, British Honduras, XI. 1931.

**dorceus** BREDDIN, 1901 (*Ptilomera*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 87—88)

♀ Holotypus, N. Celebes, Matinang Kette, Südseite, 800—1200 m, leg. SARASIN, im DEI.

**dromas** BREDDIN, 1903 (*Ptilomera*)  
(Soc. ent. 17, 147)

Syntypen, Ostjava, Südjava.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ost Java, Tengger Gebirge, leg. FRUHSTORFER; 1 Paralectotypus, Süd Java; hiermit festgelegt.

**hylactor** BREDDIN, 1903 (*Ptilomera*)  
(Soc. ent. 17, 148)

Syntypen, Annam.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Annam, Phuc-Son, XI./XII., leg. FRUHSTORFER, hiermit festgelegt.

**laelaps** BREDDIN, 1901 (*Ptilomera*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 88—89)

♂♂ Syntypen, Süd Celebes, Loka, 1000—1300 m, X. 1895, leg. SARASIN; Makassar.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Süd Celebes, Loka, 1000—1300 m, X. 1895, leg. SARASIN; 1 Paralectotypus, Macassar; hiermit festgelegt.

**lata** SHAW, 1933 (*Brachymetra*)  
(Univ. Sci. Bull. Kansas 21, 227—228)

Holotypus, zahlreiche Paratypen, Manacapuru, S. A., Amazonas, Brazil, Solimoes river, VI. 1926, leg. KLAGES, im Ent. Mus. Kansas.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**oribasus** BREDDIN, 1901 (*Ptilomera*)

(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 88)

♀ Holotypus, Celebes, Südliche Vorberge der Takalekadjo Kette, 1000 m, 7. II. 1895, leg. SARASIN, im DEI.

**pamphagus** BREDDIN, 1901 (*Ptilomera*)

(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 86–87)

♀♀ Syntypen, Celebes, Gegend südlich des Posso Sees, 900 m, 9. II. 1895, leg. SARASIN.  
DEI: ♀ Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

**peruvianus** HUNGERFORD, 1936 (*Potamobates*)

(Bull. Brooklyn Ent. Soc. 31, 178–180)

Holotypus, Peru, 5. IX. 1935, leg. WOYTKOWSKI, im Ent. Mus. Kansas; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Peru, River Sani Beni, 840 m, 5. IX. 1935, leg. WOYTKOWSKI; 1 Paratypus, Peru, Vic. of San Pedro, 900 m, 15.–29. V. 1935, leg. WOYTKOWSKI.

**pingreensis** DRAKE & HOTTES, 1925 (*Gerris*)

(Ohio Journ. Sci. 25, 49–50)

♂ Holotypus, Pingree Park, Colorado, 9300 Fuß, 18. VIII. 1924, leg. DRAKE, in Sammlung DRAKE; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Pingree Park, Colo., 22. VIII. 1924, leg. DRAKE.

**sumatranus** LUNDBLAD, 1933 (*Cylindrostethus*)

(Arch. Hydrobiol. Suppl. 12, 392–394, Fig. 124, Taf. 13)

1 ♂ Syntypus, ohne Fundort, im DEI; 1 ♀ Syntypus, Südsumatra, Musigebiet, Tjurup, 10. V. 1929, im Mus. Berlin.

DEI: 1 ♂ Syntypus, ohne Fundortangaben.

**woytkowskii** HUNGERFORD, 1935 (*Bacillometra*)

(Rev. Ent. 5, 119–122, Fig. 1, 2)

Holotypus, 89 Paratypen, Rio Rimac, Ricardo Palma, Peru, leg. WOYTKOWSKI, im Ent. Mus. Kansas.

DEI: 2 Paratypen, Peru, Ricardo Palma, 27.–29. XI. 1934, leg. WOYTKOWSKI.

**wileyi** HUNGERFORD, 1923 (*Hydrometra*)

(Canad. Ent. 55, 57–58, Fig. 1, 6, 9, 10, 11)

Holotypus, zahlreiche Paratypen, Rock Island, Colorado County, Texas, leg. WILEY, im Ent. Mus. Kansas.

DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**zeteki** DRAKE, 1952 (*Hydrometra*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 26, 2–3)

♂ Holotypus, zahlreiche Paratypen, Canal Zone, Panama, 2.–10. II. 1939, leg. DRAKE.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**Gelastocoridae****colaticollis** TODD, 1959 (*Nerthra*)

(Nova Guinea 10, 75–77)

♂ Holotypus, Hollandia, North New Guinea, V. 1945, leg. MALKIN, im U. S. N. M.; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Neu Guinea, Finschhafen, 1891, leg. FRUHSTORFER.

**occidua** TODD, 1959 (*Nerthra*)

(Nova Guinea 10, 71–72)

♂ Holotypus, Poso Lake, Central Celebes, 900 m, 9. II. 1895, im DEI.

**toxopeusi** TODD, 1959 (*Nerthra*)  
(Nova Guinea 10, 92–93)

♂ Holotypus, South Moluccas, Buru Island, Station 9, V. 1921, leg. TOXOPEUS, im Mus. Amsterdam; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.  
DEI: 1 Paratypus, Halmaheira, Soa konorra, leg. KÜKENTHAL.

### Naucoridae

**biroi** MONTANDON, 1911 (*Sagocoris*)  
(Ann. Mus. Nat. Hung. 9, 248–250)

♂♀ Syntypus, Nouvelle-Guinée, Montagnes Hansmann, Baie de l'Astrolabe, leg. BIRO, im Mus. Budapest und in Sammlung MONTANDON; 1 ♂ Nouvelle Guinée, Tanamera, 8. VII. 1903, im DEI.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Neu Guinea, Tanamera, 8. VII. 1903.

**breddini** MONTANDON, 1911 (*Cryphocricus*)  
(Bul. Soc. Sci. Bucarest 20, 88–91)

Holotypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH, im DEI.

**carolinensis** BUENO, 1907 (*Pelocoris*)  
(Canad. Ent. 39, 227–228)

Holotypus, 15 Paratypen, Lake Ellis, Havelock, leg. BRIMLEY, im U. S. N. M.  
DEI: 1 Paratypus, Lake Ellis.

**perfecta** MONTANDON, 1911 (*Gestroiella*)  
(Bul. Soc. Sci. Bucarest 20, 86–88)

Holotypus, Tonkin, Than. Moi, VI.–VII., leg. FRUHSTORFER, im DEI.

**turanicus** MONTANDON, 1911 (*Aphelochirus*)  
(Bul. Soc. Sci. Bucarest 20, 83–85)

♂ Holotypus, Turkestan, im DEI.

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

**confusus** MONTANDON (*Ambrysus*)

DEI: 1 Ex. Bolivia, Yungas la Paz, als Typus ausgezeichnet.

### Nepidae

**hoffmanni** ESAKI, 1925 (*Nepa*)  
(Ent. Mitt. 14, 313–314)

♀ Holotypus, 3 ♀♀ Paratypen, Tsintau, Nord China, V. 1913, leg. HOFFMANN, im DEI.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**horni** MONTANDON, 1911 (*Cercotmetus*)  
(Bul. Soc. Sci. Bucarest 20, 91–92)

Holotypus, Nouvelle Guinée, Jettanto?, 30. VI. 1908, im DEI.

**robustus** MONTANDON, 1911 (*Cercotmetus*)  
(Bul. Soc. Sci. Bucarest 20, 92–94)

♀ Holotypus, Celebes, Posso See und Umgebung, II. 1895, leg. SARASIN, im DEI.

**simulatus** MONTANDON, 1913 (*Laccotrephes*)  
(Bul. Soc. Sci. Bucarest 22, 122–123)

Syntypen, Pingshiang, Süd China, im DEI und in Sammlung MONTANDON.  
DEI: 4 Syntypen, Pingshiang, Süd China, leg. KREYENBERG.

**Belostomidae**

**bakeri** MONTANDON, 1913 (*Belostoma*)  
(Bul. Soc. Sci. Bucarest 22, 123–125)

1 Syntypus, Claremont, California, leg. BAKER, in Sammlung MONTANDON; 1 Syntypus, America bor. (Rivers), im DEI.

DEI: 1 Lectotypus, Hermoeta Rivers, 1 Paralectotypus, Amerika bor. Rivers; von LAUCK 1959 (i. l.) festgelegt.

**confusum** LAUCK, 1959 (*Belostoma*)  
(Bull. Chicago Acad. Sci. 11, 4–5)

♂ Holotypus, Tlalpam, D. F., Mex., 3. XI. 1936, leg. THOMAS, in den Ent. Samml. der Univ. Kansas; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Tlalpam, D. F. Mex., 3. XI. 1936, leg. THOMAS.

**Notonectidae**

**breddini** BREDDIN, 1901 (*Anisops*)  
(Abh. Nat. Ges. Halle 24, 103)

Syntypen, Celebes, Lura See bei Duri, VIII. 1895, leg. SARASIN.

DEI: 7 Syntypen, Celebes, Lura See, VIII. 1895, leg. SARASIN.

**occipitalis** BREDDIN, 1905 (*Anisops*)  
(Mitt. Nat. Mus. Hamburg 22, 152–153)

Syntypen, Java, Buitenzorg, leg. KRAEPELIN; Batavia, im DEI.

DEI: 1 Lectotypus, Batavia, hiermit festgelegt.

**spinosa** HUNGERFORD, 1930 (*Notonecta*)  
(Canad. Ent. 62, 217–218)

Holotypus, Paratypen; 10 ♂♂, 15 ♀♀, Lethi Utah, 4. IV. 1930, leg. KNOWLTON; 1 ♀, Carson City, Nevada, 9. VIII. 1929, leg. BEAMER; 2 Ex. Logan Meadows, Utah, 5./8. IV. 1930, leg. KNOWLTON; 2 Ex. Brigham, Utah, 26. IV. 1930, leg. KNOWLTON; 6 Ex. American Fork, Utah, 3. V. 1930, leg. KNOWLTON; 49 Ex. Lehi, Utah, 3. V. 1930, leg. KNOWLTON.

DEI: 1 Paratypus, Lehi Ut., 3. V. 1930, leg. KNOWLTON; 1 Paratypus Brigham Ut., 26. IV. 1930.

**Corixidae**

**batilla** HALE, 1922 (*Micronecta*)  
(Rec. S. Austr. Mus. 2, 323–325, Fig. 346)

Holotypus, South Australia, Mount Lofty Ranges, leg. HALE; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Adelaide, leg. HALE.

**compacta** HUNGERFORD, 1925 (*Arctocorixa*)  
(Bull. Brooklyn Ent. Soc. 20, 22)

Holotypus, 254 Paratypen, Eastland County, Texas, V. 1921, leg. WILEY, im Ent. Mus. Kansas.

DEI: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**gracilis** HALE, 1922 (*Micronecta*)  
(Rec. S. Austr. Mus. 2, 326–327, Fig. 347)

Holotypus, South Australia, Quorn, leg. ELSTON; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Quorn, S. Australia, leg. ELSTON.

**horni** JACZEWSKI, 1928 (*Sigara*)

(Ann. Zool. Mus. Polon. 7, 110–112)

♂ Holotypus (mikr. Pr.), 3 ♂♂, 8 ♀♀, Paratypen, Jentschoufu (Yenchowfu), Prov. Schantung, 1911–12, leg. KREYENBERG.

DEI: ♂ Holotypus, 2 ♂♂, 6 ♀♀ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**macrothoracia** JORDAN, 1943 (*Micronecta*)

(Arb. morph. tax. Ent. 10, 237–240, Fig. 1, 3, 4, 8, 9)

Syntypen, Sächsische Oberlausitz, VI. 1934/VI. 1942, in Sammlung JORDAN und im DEI.

DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Ob. Cunewalde, Ob. Laus., VI. 1942, leg. JORDAN.

**obliqua** HUNGERFORD, 1925 (*Arctocoriza*)

(Bull. Brooklyn Ent. Soc. 20, 142–143)

Holotypus, zahlreiche Paratypen; Douglas County, Kansas; Minnesota, Texas, Iowa, Oklahoma, New Jersey, New York, Illinois, Missouri; im Ent. Mus. Kansas.

DEI: 2 Paratypen, Robert Guentert, Douglas Co., Kans., 28. X. 1921.

**parvipunctata** HALE, 1922 (*Porocoriza*)

(Rec. S. Austr. Mus. 2, 320–321, Fig. 344)

Holotypus, South Australia, Adelaide, leg. HALE; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Quorn, S. Australia, leg. ELSTON.

**persica** JACZEWSKI, 1927 (*Trichocoriza*)

(Ent. Mitt. 16, 417–419, Fig. 6–12)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Basra, 13.–15. IV. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI.

**robusta** HALE, 1922 (*Micronecta*)

(Rec. S. Austr. Mus. 2, 325–326, Fig. 347)

Holotypus, South Australia, Adelaide, leg. HALE; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Murray Bridge, S. Australien.

**truncatipala** HALE, 1922 (*Arctocoriza*)

(Rec. S. Austr. Mus. 2, 314–316, Fig. 341)

Holotypus, South Australia, Adelaide, leg. HALE; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Adelaide, leg. HALE.

**vulgaris** HUNGERFORD, 1925 (*Arctocoriza*)

(Bull. Brooklyn Ent. Soc. 20, 143–144, Taf. 1 Fig. 1, 2)

Zahlreiche Typen, Douglas County, Kansas; 190 Typen, St. Paul, Minnesota; 211 Typen, Douglas Lake, Michigan; 20 Typen, Ithaca.

DEI: 2 Paratypen, Robert Guentert, Douglas Co., Kansas, 28. X. 1921.

**yui** CHEN, 1960 (*Micronecta*)

(Journ. Kansas ent. Soc. 33, 114–115)

♂ Holotypus, Karenko, Taiwan, China, IX. 1954, leg. F. Y. YU, im Mus. Nat. Taiwan; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 22 Paratypen, Kankau (Koshun), Formosa, IX. 1912, leg. SAUTER.



### Zusammenfassung

Es wird ein Katalog der Heteropteren-Typen vorgelegt, die in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrt werden.

### Summary

There is presented a catalogue of type specimens Heteroptera preserved in the collections of the former Deutsches Entomologisches Institut.

### Резюме

Предлагается каталог типов отряда Heteroptera, которые хранятся в коллекциях бывшего Немецкого Энтомологического Института.

### Besprechungen

**Aubert, J. F.** Les Ichneumonides ouest-paléarctiques et leurs hôtes. 1. Pimplinae, Xoridinae, Acaenitinae. QUATRE FEUILLES Editeur, Alfortville. 1969; 15,5 × 22 cm. 302 S. Preis 80,00 fr. F.

Die Erarbeitung von Katalogwerken ist besonders für die umfangreiche, unzureichend bearbeitete Gruppe der parasitischen Hymenopteren bedeutungsvoll. Dies wird hier nicht zum ersten Mal hervorgehoben; denn das Erscheinen der groß angelegten Serien wie die Neuauflage des „Hymenopterorum Catalogus“ und speziell des „Index of entomophagous insects“ sind dringendes Bedürfnis zahlreicher Wissensgebiete der Entomologie. Die Mühe und Geduld, die zur Zusammenstellung solcher Kataloge notwendig sind, kann nur der ermessen, der es selbst einmal damit versucht hat. Deshalb ist auch das Erscheinen des vorliegenden Werkes zu begrüßen, welches nach seinem Aufbau der zuletzt genannten Publikationsreihe nahe kommt, für die es ursprünglich wohl auch gedacht war. — Die Einleitung hebt hervor, daß zur Zeit in der Nomenklatur der Ichneumonidae zwei Auffassungen bestehen. Wer jedoch die Verhältnisse gut kennt, weiß, daß damit des „Guten“ noch nicht genug ist und zum Beispiel auch der Verfasser des Kataloges sich nomenklatorische Eigenwilligkeiten vorbehält. — Der 1. Teil umfaßt eine systematische Gliederung der Unterfamilien mit entsprechenden Angaben über Synonyme, Gattungstypen, taxonomische Literatur (nur Verfasser und Jahr), Aufzählung von Wirten (meist mit Literatur), Hinweise auf die Biologie (soweit vorhanden ebenfalls mit Literatur) und die geographische Verbreitung für Gattungen und Arten. Solche Hinweise für höhere Taxa fehlen. — Den 2. Teil bildet ein systematisches Wirt-Parasit-Verzeichnis, dem sich eine Bibliographie und je ein Index für Parasiten und Wirte anschließen. — Der Verfasser des Werkes arbeitet, wie aus dem Literaturverzeichnis hervorgeht, seit fast zwei Jahrzehnten über Ichneumonidae und hat zweifellos gute Spezialkenntnisse. Unverständlich bleibt, da weniger auf die ausführliche Nomenklatur und Taxonomie als vielmehr auf biologische Angaben Wert gelegt wurde, das Fehlen von Hinweisen auf solch grundlegende Werke wie BISCHOFF 1927 (Biologie der Hymenopteren) oder CLAUSEN 1940 (Entomophagous Insects), die auch nicht in der Bibliographie erfaßt sind. Erwähnt wird auch nicht der spanische Hymenopteren-Katalog von CEBALLOS (1956), der zumindest faunistische Bedeutung hat. Der Katalog von OEHLKE (1967) ist zwar in der Literatur genannt, wurde aber im einzelnen nicht ausgewertet. Zum Teil als Flüchtigkeitsfehler entschuldbar, sind eine Reihe fehlender oder falscher Angaben. So seien zum Beispiel genannt: *Ephialtes luceus* HEDWIG wird zwar im Index angeführt, auf der angegebenen Seite aber fehlt sie; bei *Scambus annulata* (!) (KISS) p. 25 fehlen wichtige Literaturangaben (OEHLKE 1966: Klärung der Synonymie und Systematik und KELÉR 1937, 1940: Biologie); auf derselben Seite, letzte Zeile, muß es heißen „*culpator* MORLEY 1914“; vergeblich wird man Angaben über *Scambus atrocoxalis* bei OEHLKE (1964) suchen; dafür